

Über
Sulfamido-acet-immonium-chlorid,
 $\text{H}_3\text{C}-\text{C}(=\text{NH}_2^+\text{Cl}^-)\text{NH}-\text{SO}_2-\text{NH}_2$

von
Dieter Zöllner
aus Lauf/Pegnitz

Über
Sulfamido-acet-immonium-chlorid,
 $\text{H}_3\text{C}-\text{C}(=\text{NH}_2^+\text{Cl}^-)\text{NH}-\text{SO}_2-\text{NH}_2$

der Naturwissenschaftlichen Fakultät
der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
zur
Erlangung des Doktorgrades
vorgelegt von
Dieter Z ö l l n e r
aus
Lauf/Pegnitz

Als Dissertation genehmigt
von der Naturwissenschaftlichen Fakultät
der Universität Erlangen-Nürnberg



Tag der mündlichen Prüfung: 21. Juli 1965

Dekan: Universitätsprofessor Dr. Th. Ernst

Berichterstatter: Universitätsprofessor Dr.A. Meuwssen

Berichterstatter: Universitätsprofessor Dr.K. Brodersen

Meinen Eltern in Dankbarkeit gewidmet !

Vorliegende Arbeit wurde von Dezember 1963 bis April 1965 im Institut für Anorganische Chemie der Universität Erlangen-Nürnberg ausgeführt.

Meinem sehr verehrten Lehrer,

Herrn Univ. Prof. Dr. Alwin Meuwsen,
danke ich sehr herzlich für das dieser Arbeit stets entgegengebrachte Interesse sowie für die zahlreichen wertvollen Ratschläge, die ich während der Ausführung der Arbeit von ihm erhalten habe.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Zusammenfassung	1
Allgemeiner Teil	5
<u>Vorversuche</u>	6
Sulfamid in Acetonitril	6
Chlorwasserstoff in Acetonitril	7
Sulfurylchlorid in Acetonitril	8
<u>Sulfamido-acet-immonium-chlorid</u>	10
Hydrolysen	11
Verhalten in Pyridin	13
<u>N-Amino-sulfonyl-acetamidin</u>	16
Vergleich von Acetamidin mit N-Amino-sulfonylacetamidin	18
Salze von N-Amino-sulfonyl-acetamidin	19
mit HBr	19
mit p-Toluolsulfonsäure	19
mit α -Naphthylsulfonsäure	20
<u>Sulfamido-prop-immonium-chlorid</u>	20
<u>Sulfamido-carbo-methoxy-acet-immonium-chlorid</u>	21
Sulfamido-carbo-äthoxy-acet-immonium-chlorid	21
<u>Methyl-mercapto-N-amino-sulfonyl-form-amidinium-chlorid</u>	23
Sulfamid und Sulfurylchlorid in Acetonitril	24

Ver s u c h s t e i l	32
Lösungsmittel und Ausgangsstoffe	32
Analytisches	42
Papier-chromatographie	43
Löslichkeit von Sulfamid in Acetonitril	47
Leitfähigkeitsmessungen	48
Verhalten von Sulfamid in Acetonitril	50
Reaktion von Sulfamid mit Chlorwasser- stoff in siedendem Acetonitril	50
<u>Sulfamido-acet-immonium-chlorid</u>	56
Hydrolyse bei 25°	57
Molekulargewichtsbestimmung	57
Hydrolyse bei 90°	59
alkalische Hydrolyse	61
Erhitzen in siedendem Pyridin	63
Verhalten in kaltem Pyridin	64
Thermisches Verhalten	67
<u>N-Amino-sulfonyl-acetamidin</u>	65
Molekulargewicht	65
Alkalische Hydrolyse	66
Thermisches Verhalten	69
Umsetzung mit Sulfurylchlorid	69
Sulfamido-acet-immonium-bromid	71
Sulfamido-acet-immonium-p-toluol-sulfonat	72

Sulfamido-acet-immonium- α -naphthyl-sulfonat	72
Sulfamido-prop-immonium-chlorid	73
Sulfamido-carbo-methoxy-acet-immonium-chlorid	73
Sulfamido-carbo-äthoxy-acet-immonium-chlorid	74
Umsetzung von substituierten Sulfamiden mit Acetonitril und Chlorwasserstoff	75
Harnstoff, Acetonitril und Chlorwasserstoff	76
Thioharnstoff, Acetonitril und Chlorwasserstoff	78
Urethan, Acetonitril und Chlorwasserstoff	78
Methyl-mercapto-N-amino-sulfonyl-form-amidinium- chlorid	79

Umsetzung von Sulfurylchlorid und Sulfamid in siedendem

<u>Acetonitril</u>	81
Molverhältnis 2 : 1	81
Molverhältnis 1 : 1	81
Molverhältnis 1 : 3	85

A n h a n g	91
IR-Spektren von Sulfamido-acet-immonium-chlorid und N-Amino-sulfonyl-acetamidin von Dr. E. Lindner	91

Z u s a m m e n f a s s u n g

1. Leitet man trockenen ClH in eine Lösung von Schwefelsäure-diamid (Sulfamid, $(\text{H}_2\text{N})_2\text{SO}_2$) in Acetonitril, so entstehen luftbeständige, farblose Kristalle von Sulfamido-acet-immonium-chlorid (I),




Schmp: $157^\circ - 160^\circ$ (Zersetzung ab 120°). Löslich in kaltem CH_3OH , $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, siedendem Eisessig ($\sim 120^\circ$); unlöslich in Äther, Aceton, CHCl_3 , CCl_4 , Benzol, Methyl- und Äthylacetat, Tetrahydrofuran.


Kaltes Wasser löst mit stark saurerer Reaktion. Nach Dissoziation:




folgt Hydrolyse zu Sulfamid und Acetamid:




Hydrolyse von I bei 90° führt teilweise ($\sim 12\%$ in 60 min) zum NH_4 -Imido-disulfamid, $\text{NH}_4\text{-N(SO}_2\text{NH}_2)_2$




Die heiße alkalische Hydrolyse von I verläuft in etwa 15 min nach



Siedendes Pyridin ($\sim 115^\circ$) zerlegt I in Acetonitril und Imido-disulfamid ($\sim 50\%$):




Bei Raumtemperatur reagiert Pyridin mit I nach



wobei N-Amino-sulfonyl-acet-amidin, $\text{H}_3\text{C}-\text{C}(=\text{NH})\text{NH}-\text{SO}_2-\text{NH}_2$ (II), ($\sim 35\%$) entsteht.

2. II wird mit 55 % Ausbeute aus I und KOH in absol. CH_3OH bei Raumtemperatur erhalten.



Schmp: $125^\circ - 130^\circ$ (Zersetzung ab 120°); farblose Kristalle; gut löslich in CH_3OH , $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, Pyridin, löslich in Eisessig; siedendem CH_3CN (82°), unlöslich Äther in Benzol, CHCl_3 , CCl_4 , Methylacetat.

Während I in heißem CH_3CN ($\sim 82^\circ$) nicht mit SO_2Cl_2 reagiert, wurde aus II und SO_2Cl_2 in siedendem CH_3CN das bekannte (51, 59) Sulfamid-mono-sulfonat, $\text{H}_2\text{N}-\text{SO}_2-\text{N}(\text{NH}_4)-\text{SO}_3\text{NH}_4$ ($\sim 50\%$) erhalten.

3. Mit 25 - 40 % Ausbeute wurden aus Sulfamid und weiteren Nitrilen erhalten:

- a) Sulfamido-prop-immonium-chlorid, $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{C}(=\text{NH}_2^+\text{Cl}^-)-\text{NH}-\text{SO}_2-\text{NH}_2$
Schmp: $160^\circ - 162^\circ$
- b) Sulfamido-carbo-methoxy-acet-immonium-chlorid,
 $\text{H}_3\text{C}-\text{O}-\text{CO}-\text{CH}_2-\text{C}(=\text{NH}_2^+\text{Cl}^-)\text{NH}-\text{SO}_2-\text{NH}_2$;
Schmp: $120^\circ - 125^\circ$
- c) Sulfamido-carbo-äthoxy-acet-immonium-chlorid,
 $\text{C}_2\text{H}_5-\text{O}-\text{CO}-\text{CH}_2-\text{C}(=\text{NH}_2^+\text{Cl}^-)\text{NH}-\text{SO}_2-\text{NH}_2$,
Schmp. 124°
- d) Methyl-mercapto-N-amino-sulfonyl-form-amidinium-chlorid,
 $\text{H}_3\text{C}-\text{S}-\text{C}(=\text{NH}_2^+\text{Cl}^-)\text{NH}-\text{SO}_2-\text{NH}_2$

Salze von II sind außer I

- e) Sulfamido-acet-immonium-bromid, $\text{H}_3\text{C}-\text{C}(=\text{NH}_2^+\text{Br}^-)\text{NH}-\text{SO}_2-\text{NH}_2$
aus Sulfamid, CH_3CN und HBr ($\sim 17\%$)
Schmp: 155°
- f) Sulfamido-acet-immonium-p-toluol-sulfonat,
 $\text{H}_3\text{C}-\text{C}(=\text{NH}_2^+ \text{ } ^-\text{O}_3\text{S}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}_3)\text{NH}-\text{SO}_2-\text{NH}_2$ ($\sim 32\%$)
Schmp: $168^\circ - 169^\circ$
- g) Sulfamido-acet-immonium- α -naphthol-sulfonat,
 $\text{H}_3\text{C}-\text{C}(=\text{NH}_2^+ \text{ } ^-\text{O}_3\text{S}-\text{C}_{10}\text{H}_8)\text{NH}-\text{SO}_2-\text{NH}_2$ ($\sim 17\%$)
Schmp: $174^\circ - 175^\circ$

Sulfamid-derivate wie Mono-butyl-sulfamid, $\text{C}_4\text{H}_9-\text{NH}-\text{SO}_2-\text{NH}_2$,
ferner asym. Dimethyl-sulfamid, $(\text{CH}_3)_2\text{N}-\text{SO}_2-\text{NH}_2$ oder
sym. Dibutylsulfamid, $(\text{C}_4\text{H}_9\text{NH})_2\text{SO}_2$ setzen sich mit CH_3CN
und HCl nicht um.

Mit Harnstoff als

Sulfamid Analogem und Thioharnstoff entstehen in CH_3CN
mit HCl die bekannten HCl -Addukte $(\text{H}_2\text{N})_2\text{CO} \cdot \text{HCl}$;
 $2(\text{H}_2\text{N})_2\text{CO} \cdot \text{HCl}$ bzw. $(\text{H}_2\text{N})_2\text{CS} \cdot \text{HCl}$

4. Nach Bencker, Leiderer und Meuwsen (6) liefern $(\text{H}_2\text{N})_2\text{SO}_2$ und Cl_2SO_2 im Molverhältnis 1 : 1 in heißem Acetonitril ($\sim 82^\circ$) Ammonium-tetra-sulfimid, $(\text{NH}_4\text{NSO}_2)_4$ mit 30 % Ausbeute. Durch Änderung der Reaktionsbedingungen läßt sich die $(\text{NH}_4\text{NSO}_2)_4$ -Ausbeute (bezogen auf Sulfamid) nicht steigern.

Papierchromatographische Untersuchungen zeigen, daß die Umsetzung einerseits über noch unbekannte Sulfochloride wie $\text{H}_2\text{N}(\text{SO}_2\text{-NH})_n\text{-SO}_2\text{Cl}$ oder $\text{ClSO}_2\text{-NH}(\text{SO}_2\text{NH})_n\text{SO}_2\text{Cl}$ abläuft, ferner vermag der bei der Umsetzung auftretende ClH das Sulfamid zum Imido-disulfamid, $\text{HN}(\text{SO}_2\text{-NH}_2)_2$, zu kondensieren ($\sim 13\%$). Dies reagiert (nach Siegelin, 19) mit SO_2Cl_2 in siedendem CH_3CN mit 60 % Ausbeute zu $(\text{NH}_4\text{NSO}_2)_4$. Die dritte Möglichkeit zum Tetra-sulfimid zu gelangen, führt über das chromatographisch im Reaktionsgut nachgewiesene Sulfuryl-disulfamid, $\text{SO}_2(\text{NH-SO}_2\text{-NH}_2)_2$, das mit SO_2Cl_2 in siedendem CH_3CN ebenfalls Tetra-sulfimid ($\sim 15\%$ Ausbeute) bildet (Meuwsen und Papenfuß, 22).

Allgemeiner Teil

Nach Studium des Reaktionsablaufes der Umsetzung von Sulfamid, $(\text{H}_2\text{N})_2\text{SO}_2$ mit Sulfurylchlorid, SO_2Cl_2 , in siedendem Acetonitril, CH_3CN , zum Ammonium-tetra-sulfimid, $(\text{NH}_4\text{NSO}_2)_4$, (Bencker, Leiderer, Meuwesen, 6) stellte sich die Frage nach dem Verhalten von Sulfamid in Acetonitril bei Gegenwart von HCl .

Matsui (26) erhielt beim Einleiten von HCl in kalte, ätherische Benzonitril-Lösung von Thiobenzamid eine Verbindung, die von Ishikawa 1921 (27) als N-Benz-imido-yl-thio-benzamid identifiziert wurde.



Auch Sulfonamide ließen sich durch Erhitzen in Benzol oder Alkohol mit Imidaten zusammenlagern (28, 29). Mit der Sulfonamid-gruppierung reagiert ein Imidat selbst, wenn im Sulfonamid noch eine zusätzliche Amingruppe vorliegt (30, 31)

$$\text{H}_2\text{N}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{SO}_2-\text{NH}_2 + \text{RC}(=\text{NH})\text{Cl} \longrightarrow \text{R}-\text{C}(=\text{NH}_2^+\text{Cl}^-)\text{NH}-\text{SO}_2-\text{C}_6\text{H}_4-\text{NH}_2$$

Amidine, $\text{R}-\text{C}(=\text{NH})\text{NH}_2$, sind stark basische Verbindungen, deren an den Stickstoff gebundenen Wasserstoffatome ganz oder teilweise durch Alkyl- bzw. Arylreste oder Metalle ersetzt sein können.

Bereits 1877 konnten sie von Pinner (1,2) als unsubstituierte Amidin-hydrochloride durch Umsetzen von Imidaten mit Ammoniak in wasserfreiem Alkohol dargestellt werden.



Vorversuche

Sulfamid in Acetonitril

In Wasser löst sich Sulfamid mit neutraler Reaktion gut. Mangels Literaturangaben (außer 32) untersuchten wir durch gravimetrische Bestimmung des Rückstandes abgedunsteter Lösungen die Löslichkeit von Sulfamid in Acetonitril. Von etwa 1 Mol/Liter bei Raumtemperatur, etwa 2 Mol/Liter bei 50 ° steigert sich die Löslichkeit auf etwa 5 Mol ($\text{H}_2\text{N})_2\text{SO}_2$ /Liter bei 70 ° (Abb. 1).




Abb. 1



Abb. 2
Leitfähigkeit von Sulfamid
in Acetonitril

Traube und Reupke (14) fanden, daß $(\text{H}_2\text{N})_2\text{SO}_2$ in wässrigen Lösungen ein Nichtelektrolyt ist. Die elektrische Leitfähigkeit der wässrigen Lösung von reinem Sulfamid ist


nach Hantzsch und Holl (23) nur etwa dreimal so groß wie diejenige reinsten Wassers. Daß $(\text{H}_2\text{N})_2\text{SO}_2$ in CH_3CN weitgehend molekular gelöst ist, zeigen die Leitfähigkeitskurven von Sulfamid in Wasser und Acetonitril (Abb. 2).

Acetonitril ist ein Protonenacceptor und reagiert daher basisch. Sein Dipolmoment beträgt 3,94 Debye und begünstigt Reaktionen, bei denen Ladungen entstehen. Wird Sulfamid in siedendem Acetonitril ($\sim 82^\circ$) unter Feuchtigkeitsausschluß 18 h erhitzt, so erhält man unverändertes Sulfamid zurück. Weder Schmp. ($90^\circ - 92^\circ$ bzw. $89^\circ - 91^\circ$) noch Chromatogramm deuten darauf hin, daß eine Umsetzung oder Umlagerung stattgefunden hat.


Chlorwasserstoff in Acetonitril

Eine wesentliche Rolle spielt bei unseren Umsetzungen HCl in CH_3CN . Lösungsmittel mit polarer CN -Gruppe haben infolge des freien Elektronenpaares am Nitrilstickstoff und der Elektronen der CN -Bindung Elektronenpaar-donatoreigenschaften und sind schwach basisch. Hantzsch (35) zeigte dies bereits 1931 beim Acetonitril. Die Halogenwasserstoffe in Acetonitril sind entgegen der Ansicht von Fleskov (42), wie neuere Untersuchungen zeigten, schwache Säuren. ClH wird mit Nitrilen ein Säure-Base-Gleichgewicht eingehen. Acetonitril fungiert als Oniumdonator; HCl als G^- -dissoziierender Acceptor.


Bei kleinen $[\text{ClH}]$ bilden sich in Acetonitril bei niedriger Temperatur Nitriliumsalze $(\text{R}-\text{C}=\text{NH})^+\text{Cl}^-$ (Zersetzungspunkte zwischen 100° und 200°), die sowohl molekular als auch ionisch gelöst werden (36, 37, 38, 40)



Es liegt ein Energie-charge-transfer-Komplex vor (Mulliken, 41). Der Umlagerung des äußeren in den inneren Komplex folgt die Ionisation.




Die Komplexe wurden durch chemische Analyse, IR-Spektren (38) sowie durch Gefrierpunktmessungen (43) sichergestellt. Bei größeren $[\text{ClH}]$ steigt die Leitfähigkeit anormal an. Es bilden sich solvatisierte Ionen, wie $(\text{HCl}_2)^-$ und $(\text{CH}_3\text{C}(\text{Cl})=\text{NH}_2)^+$



Sulfurylchlorid in Acetonitril

Nach Goehring (138)


spielt bei Umsetzungen von SO_2Cl_2 in flüssigem NH_3 das Gleichgewicht




eine Rolle. Nach unseren Leitfähigkeitsmessungen trifft dies auch

für die Lösung von SO_2Cl_2 in CH_3CN zu (Abb. 3). Vielleicht sind die SO_2Cl^+ Ionen als Addukt


Abb. 3
Leitfähigkeit von SO_2Cl_2 in Acetonitril



zugegen, analog der Verbindung aus CH_3CN und BCl_3



Eitner (3, 4, 5) erhielt beim Einleiten von SO_3 in sorgfältig getrocknetes Benzonitril, $\text{C}_6\text{H}_5\text{CN}$, zitronengelbe Kristalle von Benzoyl-sulfo-benzamidinsäureanhydrid



die aus warmen Benzol ($50^\circ - 60^\circ$) umkristallisiert, bei 157° bis 160° schmelzen.

Während sich SO_2 in CH_3CN farblos löst, erhält man bei der Einwirkung von SO_3 auf Acetonitril eine in allen gebräuchlichen indifferenten Lösungsmitteln unlösliche gelbe Verbindung $3 \text{CH}_3\text{CN} \cdot 2 \text{SO}_3$. Wasserfreie H_2SO_4 liefert mit CH_3CN zitronengelbes, kristallines $2 \text{CH}_3\text{CN} \cdot \text{H}_2\text{SO}_4$, das als Acetylsulfoacetamidinsäure bezeichnet wird, $\text{H}_3\text{C}-\text{C}(=\text{NSO}_3\text{H})\text{NH}-\text{CO}-\text{CH}_3$ (3, 4, 5).


Auch beim Auflösen von SO_2Cl_2 in Acetonitril tritt sofort intensiv gelbe Färbung ein. Frischdestilliertes SO_2Cl_2 ist farblos, färbt sich aber beim Stehen langsam gelb; das Gleichgewicht



stellt sich ein. Zu Beginn aller Umsetzungen von SO_2Cl_2 und $\text{SO}_2(\text{NH}_2)_2$ in heißem CH_3CN entweicht etwas Cl_2 und SO_2 . Bei der gaschromatographischen Untersuchung von CH_3CN , als Lösungsmittel für Umsetzungen von SO_2Cl_2 verwendet, ließ sich Monochlor-acetonitril, ClCH_2CN ($\sim 5 \text{ } \frac{\text{g}}{100}$) erkennen. Wir isolierten aus dem Reaktionsgut von SO_2Cl_2 mit CH_3CN nach Erhitzen mit Ammoniakwasser (bei Abwesenheit von Sulfamid) Trichlor-acetamid.

Leitet man ClH in eine Lösung von Sulfamid in siedendem CH_3CN , so liegen nach der Umsetzung Imido-disulfamid, $\text{HN}(\text{SO}_2\text{NH}_2)_2$, Sulfuryldisulfamid, $\text{SO}_2(\text{NHSO}_2\text{NH}_2)_2$, zwei höhere,

kettenförmig gebaute N-S-Verbindungen sowie etwas Sulfat und Amidosulfat vor. Mit steigender Kettenlänge sinkt der Anteil an entstandener Substanz. Aus einem Extrakt des Rückstandes mit Isopropanol kristallisieren in der Kälte große, farblose Kristalle von Imido-disulfamid (Schmp 155° - 157°) mit fast 13 % Ausbeute aus.



Sulfamido-acet-immonium-chlorid, $\text{H}_3\text{C-C(=NH}_2^+\text{Cl}^-)\text{NH-SO}_2\text{-NH}_2$
 =====

Verbindungen mit der Gruppe $-\text{SO}_2\text{-NH-C(=N)-}$ gelten als hochwirksame Medikamente der Sulfonamidreihe zur Chemotherapie bakterieller Infektionen (10).

Eine Verbindung ähnlicher Struktur erhält man beim Einleiten von trockenem ClH in Acetonitril und Sulfamid. Dabei tritt zunächst völlige Auflösung unter Erwärmen ein; dann beginnt sich Sulfamido-acet-immonium-chlorid (I), $\text{H}_3\text{C-C(=NH}_2^+\text{Cl}^-)\text{NH-SO}_2\text{-NH}_2$, mit 75 % Ausbeute in farblosen Kristallen vom Schmp: 157° - 160° (Zersetzung ab 120°) abzuscheiden (44)




Unlöslich ist die Verbindung in Äther, Tetrahydrofuran, CCl_4 , CHCl_3 , Methyl- und Äthylacetat. Bei Raumtemperatur in Acetonitril praktisch unlöslich, verändert sich I in siedendem CH_3CN ($\sim 82^{\circ}$) nicht und kann daraus selbst nach 24 h unverändert zurückgewonnen werden. Eisessig löst bei Raumtemperatur nur schwer; hingegen werden von 100 ml siedendem Eisessig ($\sim 118^{\circ}$) 4 - 5 g I gelöst. Beim Erkalten kristallisieren etwa 85 - 90 % der Verbindung wieder aus Schmp 160° .

In Methanol ist I (etwa 15proz. Lösung) in $\text{H}_3\text{C}-\text{C}(=\text{NH})\text{NH}-\text{SO}_2-\text{NH}_2$ und HCl dissoziiert (siehe Darstellung von N-Amino-sulfonyl-acetamidin, Seite 16)



Auch in Wasser erfolgt zunächst Dissoziation. H^+ und Cl^- können titriert werden. Für das Vorliegen der freien Sulfamido-Verbindung spricht auch die Beständigkeit eines intensiv violettblauen Kupferkomplexes in alkalischem Medium.


Der Dissoziation folgt Hydrolyse:




Das mittlere Molekulargewicht der in 0,06 - 0,07 molarer wässriger Lösung bei 65 ° vorliegenden Teilchen beträgt - osmometrisch bestimmt - etwa 60. Dies spricht dafür, daß in frisch bereiteter wässriger Lösung gleichzeitig 5 Teilchen - allerdings in unterschiedlichen Konzentrationen - vorliegen; nämlich $\text{H}_3\text{C}-\text{C}(=\text{NH})\text{NH}-\text{SO}_2-\text{NH}_2$, H^+ , Cl^- sowie $(\text{H}_2\text{N})_2\text{SO}_2$ und $\text{CH}_3-\text{CO}-\text{NH}_2$.

Komplizierter verläuft die heiße Hydrolyse von I. Verfolgt man die qualitative Zusammensetzung einer auf 90 ° erhitzten 1proz. wässrigen Lösung von I chromatographisch, so


tritt nach etwa 30 min neben Sulfamid auch Imido-disulfamid auf, dessen Menge augenscheinlich steigt. Nach 50 min findet man auch Amidosulfat. Bei Aufarbeitung etwas größerer Ansätze wurden ~ 10 - 13 % freies Imido-disulfamid $\text{HN}(\text{SO}_2\text{NH}_2)_2$ oder 13 - 14 % des Silbersalzes $\text{AgN}(\text{SO}_2\text{NH}_2)_2 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$ (7) isoliert. Für den Vorgang ergibt sich die Summenformel:



Entstehende Amido-schwefelsäure, $\text{H}_2\text{N}-\text{SO}_3\text{H}$, wurde chromatographisch erkannt und entsteht durch Hydrolyse von Imido-disulfamid. Aus ihm erhielt Leiderer (9) fast quantitativ in kalter 2n HCl Sulfamid und Amido-schwefelsäure:



Mit siedend heißer 2n HCl war nach 90 min völlige Spaltung in Sulfamid, Sulfat und NH_4^+ eingetreten



Die relativ leichte Hydrolyse in der Hitze ist charakteristisch für Amidine. Acetamidin reagiert bereits beim gelinden Erwärmen in wässriger Lösung (8) rasch nach



Alkalische Hydrolyse von $\text{H}_3\text{C}-\text{C}(=\text{NH}_2^+\text{Cl}^-)\text{NH}-\text{SO}_2-\text{NH}_2$ (I)

Verseift man mit 30proz. NaOH in der Kjeldahl-apparatur, so werden 2/3 vom Gesamt-N als NH_3 frei.


Sulfamid liefert mit 30proz. NaOH die Hälfte seines N als NH_3 (53, 54)



Aus Acetonitril wird unter gleichen Bedingungen nur etwas über 1/3 seines Stickstoffes als NH_3 frei, so daß Acetonitril bei der Hydrolyse von I nicht entstanden sein kann. Dagegen wird aus Acetamid bei der Verseifung mit Alkalilauge quantitativ NH_3 entbunden.




Die alkalische Hydrolyse entspricht somit der Bruttogleichung



Beim Behandeln von I mit alkalischer Hypobromitlösung werden 2/3 seines Gesamt-N frei. Acetamid reagiert zwar mit Hypobromit und unterliegt bei 70° dem Carbonsäureamidabbau nach Hofmann (55, 56, 57, 58), es findet jedoch keine N_2 -Entwicklung statt. Nach Joseph (60) läßt sich der Gesamtstickstoff von Sulfamid mit Hypobromit gasvolumetrisch bestimmen




Der gasvolumetrisch erfaßte N-Anteil stammt somit aus dem Sulfamid. Auch diese Reaktion spricht für einen alkalischen Zerfall:



Sulfamido-acet-immonium-chlorid in Pyridin

Beim Schütteln von I in kaltem Pyridin entsteht einerseits Sulfamid (50 %), andererseits N-Amino-sulfonyl-acetamidin (II), $\text{H}_3\text{C-C(=NH)NH-SO}_2\text{-NH}_2$, ($\sim 35\%$). Sulfamid kann aus dem Rückstand, der nach Abdunsten des Pyridins

verbleibt, durch Extraktion mit Methylacetat, II aus dem Extraktionsrückstand durch Ausziehen mit Methanol gewonnen werden.



Der Zerfall in Sulfamid und Acetonitril ist durch den stärkeren nucleophilen Charakter des Pyridins zu erklären, das am elektrophilen C-Atom der polaren $-\text{C}(=\text{N}-)\text{NH}_2$ Bindungen angreift. Sulfamid entsteht dabei aus II.

In siedendem Pyridin ($\sim 115^\circ$) ist I völlig in CH_3CN und Sulfamid zerfallen, das nach Kirssanow und Solotow (49) unter NH_3 -Abspaltung zum Imido-disulfamid kondensiert wird.

Aus den Reaktionen von I ergibt sich als Struktur




Abb. 3





Abb. 4

die eines Sulfamido-acet-immonium-chlorids. Herrn Prof. Dr. Fießelmann vom hiesigen Institut für Organische Chemie danken wir für die von ihm vorgeschlagene Benennung des neuen Körpers.

Im IR-Spektrum (IR 1) treten die Schwingungen folgender Atomgruppierungen auf:


NH, CH, C-N, $-\text{SO}_2-$, N-C=N, N-S-N



IR 1


Aufnahme und Auswertung der IR-Spektren besorgte Herr Dr. E. Lindner im hiesigen Institut für Anorganische Chemie (Vorstand Prof. Dr. Ing. Behrens). Ihm sowie Herrn Prof. Behrens wird dafür sehr herzlich gedankt.

Demnach liegt im Sulfamido-acet-immonium-chlorid sehr wahrscheinlich ein durch Wasserstoffbrückenbindung gebildeter Sechsring vor (ausführlicher siehe Seite 94).




N-Amino-sulfonyl-acetamidin, $\text{H}_3\text{C}-\text{C}(=\text{NH})\text{NH}-\text{SO}_2-\text{NH}_2$

Versetzt man die etwa 15proz. methanolische Lösung von Sulfamido-acet-immonium-chlorid, $\text{H}_3\text{C}-\text{C}(=\text{NH}_2^+\text{Cl}^-)\text{NH}\text{SO}_2\text{NH}_2$ mit der berechneten Menge etwa 12proz., absolut methanolischer KOH, so fällt KCl aus. Nach dessen Abtrennung hat man eine methanolische Lösung des freien N-Amino-sulfonyl-acetamidins, $\text{H}_3\text{C}-\text{C}(=\text{NH})\text{NH}-\text{SO}_2-\text{NH}_2$ (II), das beim Abdunsten des Methanols auf etwa 1/4 des Volumens bei Raumtemperatur im Vakuum ausfällt und, aus Acetonitril umkristallisiert, farblose Kristalle bildet. Ausbeute 55 %; Schmp: $125^\circ - 130^\circ$ (Zersetzung ab 120°)




gut löslich in CH_3OH , $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, Pyridin; Acetonitril nimmt II zu einer etwa 1 - 2proz. Lösung bei Raumtemperatur auf, während man in der Siedehitze etwa 15 - 20proz. Lösungen erhält. Aus heißem Eisessig ($\sim 120^\circ$) läßt sich II nur mit erheblichen Verlusten umkristallisieren. Unlöslich ist die Verbindung in Äther, Benzol, CHCl_3 , CCl_4 , Methylacetat.


Bei der Hydrolyse in siedender 2n NaOH werden 2/3 des Gesamt-N als NH_3 entbunden.




Während I in heißem CH_3CN ($\sim 52^\circ$) nicht mit SO_2Cl_2 reagiert, wird aus II und SO_2Cl_2 (Molverhältnis 1 : 1) in siedendem Acetonitril nach Aufarbeitung mit $\text{NH}_3/\text{H}_2\text{O}$ das bekannte (51, 59) Sulfamid-monosulfonat, $\text{H}_2\text{N}-\text{SO}_2-\text{N}(\text{NH}_4)\text{SO}_3\text{NH}_4$ in etwa 50proz. Ausbeute erhalten:



In der Reihe der Sulfanomidine wurden 1943 von Barber (63) die beiden Isomeren Formen




und




(a)

(b)

isoliert. Wir können daher auch bei II die beiden Tautomeren




und



annehmen.



Das IR-Spektrum (IR 2) zeigt folgende Banden:

NH, CH, C=N, C-N, $-SO_2-$, N-C=N, N-S-N



IR 2

Die genauere Diskussion wurde wie bei I von Herrn Dr. E. Lindner durchgeführt und spricht für folgende mesomeren Grenzformeln eines durch Wasserstoff-brückenbindung gebildeten Sechsringes; die möglicherweise auch die Stabilität der Substanz im Vergleich zum Acetamidin erklären können:




wobei (b) die größere Bedeutung zukommen soll.

Vergleich zwischen

Acetamidin

und

N-Amino-sulfonyl-acetamidin



Frei nicht beständig

Bis 120 ° beständige,
nicht hygroskopische,
kristalline Substanz
Schmp: 125 ° - 130 °

In wässriger Lösung
starke Base (8)

Reagiert in wässriger
Lösung neutral und hydro-
lysiert bei Raumtemperatur
langsam in Sulfamid und
Acetamid


Zerfällt bei gelindem
Erwärmen der wässrigen
Lösung in NH_3 und Essig-
säure (8) (entspricht
der alkalischen Hydro-
lyse

Heiße alkalische Hydrolyse
zu Amidosulfat, Acetat und
 NH_3

Aus Acetonitril umkristal-
lisierbar

Acetamidin-hydro-chlorid

Sulfamido-acet-immonium-
chlorid



Hygroskopische Kristalle
vom Schmp 164 ° - 166 °
(Pinner -1- und unser Prä-
parat - 110, 47) 177 °
(Barnes et al - 12)

Schwach hygroskopische Kri-
stalle, Schmp 157 ° - 160 °;
thermischer Zerfall ab 120 °

Acetamidin-hydrochlorid

Sulfamido-acet-immonium-chlorid

(1)

wässrige Lösung reagiert stark sauer

Leicht löslich in kaltem CH_3OH , $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, unlöslich in Äther

Aus Eisessig umkristallisierbar

Zerfällt thermisch in


Thermischer Zerfall läuft ab

$$\text{CH}_3\text{CN} \text{ und } \text{NH}_4\text{Cl}$$

120 ° über eine Vielzahl von

Produkten ab

Pikrat des Acetamidins



Aus wässriger Lösung des

Hydrochlorids mit Pikrin-

säure zu erhalten.



Schmp: 252 ° (13)

Liefert kein schwerlösliches

Pikrat aus wässriger Lösung

Acetamidin-p-toluol-sulfonat

Sulfamido-acet-immonium-p-
toluol-sulfonat



Schmp: 193 ° (17)


Schmp: 168 ° - 169 °

Sulfamido-acet-immonium-bromid, $\text{H}_3\text{C}-\text{C}(=\text{NH}_2^+\text{Br}^-)\text{NH}-\text{SO}_2-\text{NH}_2$

wird aus Sulfamid, Acetonitril und HBr mit $\sim 17\%$


Ausbeute als farblose Kristalle, Schmp: 155 °, erhalten.

Sulfamido-acet-immonium-p-toluol-sulfonat.



p-Toluol-sulfonsäure, $\text{H}_3\text{C}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{SO}_3\text{H}$, verdrängt HCl aus dem Chlorid beim Eindunsten der vereinigten methanolischen Lösungen. Extrahiert man den Rückstand mit Methanol/Äther (1 : 4), so hinterbleibt Sulfamido-acet-immonium-p-toluol-sulfonat. Ausbeute: $\sim 32\%$; Schmp: $168^\circ - 169^\circ$.


Sulfamido-acet-immonium- α -naphthyl-sulfonat,



wird analog aus Naphthalinsulfonsäure, $\text{C}_{10}\text{H}_8\text{SO}_3\text{H}$, und Sulfamido-acet-immonium-chlorid in Methanol erhalten. Ausbeute etwa 17% ; Schmp: $174^\circ - 175^\circ$.

Sulfamido-prop-immoniumchlorid, $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{C}(=\text{NH}_2^+\text{Cl}^-)\text{NH}-\text{SO}_2-\text{NH}_2$

Das höhere Homologe des Acetonitrils, das Propionitril, $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CN}$, bildet mit Sulfamid und ClH stäbchenförmige Kristalle von $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{C}(=\text{NH}_2^+\text{Cl}^-)\text{NH}-\text{SO}_2-\text{NH}_2$ (IR 3); Schmp: $160 - 162^\circ$ Ausbeute: $\sim 40\%$



Sulfamido-carbo-methoxy-acet-immonium-chlorid,




Auch Alkyl-carboxynitrile lagern sich an Sulfamid bei Gegenwart von HCl an. So erhielten wir mit Cyanessigsäure-methylester nach




Sulfamido-carbo-methoxy-acet-immonium-chlorid, (IR 4), in 45 % Ausbeute; Schmp: 120 ° - 125 °


IR 4



Sulfamido-carbo-äthoxy-acet-immonium-chlorid




wurde mit 25 % Ausbeute nach



IR Spektrum
von Sulfamido-
carboäthoxy-
acet-immonium-
chlorid

IR 5



Umsetzung von substituierten Sulfamiden mit CH_3CN und HCl

Es gelang nicht, substituierte Sulfamide, wie Monobutylsulfamid $\text{C}_4\text{H}_9\text{-NH-SO}_2\text{-NH}_2$, sym. Dibutylsulfamid $(\text{C}_4\text{H}_9\text{NH})_2\text{SO}_2$ und asym. Dimethylsulfamid, $(\text{H}_3\text{C})_2\text{N-SO}_2\text{-NH}_2$, an CH_3CN bei HCl Gegenwart zu addieren. Sterische Hinderungen kommen, wie man sich am Kalottenmodell veranschaulichen kann, nicht in Frage. Bei den alkylsubstituierten Sulfamiden bewirkt die im Vergleich zu Wasserstoff geringere Elektronenaffinität der Alkylreste einen +I-Effekt; die Basizität der NH_2 -Gruppe wird erhöht. Zur ungefähren Angabe der Größe des Effektes sei auf die Messungen von H. C. Brown et al. (156) über den Einfluß der Methylgruppe auf die Basizität von Amin-N an Addukten von $\text{B}(\text{CH}_3)_3$ mit NH_3 oder CH_3NH_2 und $(\text{CH}_3)_2\text{NH}$ verwiesen. Sie untersuchten die Dissoziationskonstanten dieser Additionsverbindungen im gasförmigen Zustand bei 100° . Durch Erhöhung der Elektronendichte am N-Atom nimmt die Stabilität der Addukte zu.


$\text{H}_3\text{N-B}(\text{CH}_3)_3$	$\text{H}_3\text{C-NH}_2\text{-B}(\text{CH}_3)_3$	$(\text{H}_3\text{C})_2\text{NH-B}(\text{CH}_3)_3$
Dissoz. Konst.: 4,6	0,0350	0,0214

Umsetzung von Harnstoff mit CH_3CN und HCl

Versuche, aus Harnstoff, Acetonitril und HCl ein Acet-immonium-chlorid des Harnstoffes darzustellen, scheiterten. Die Umsetzungen führten nur zu dem bereits bekannten (72, 73) Harnstoff-hydrochlorid, $(\text{H}_2\text{N})_2\text{CO} \cdot \text{HCl}$, vom Schmp: $37^\circ - 40^\circ$ und dem hygroskopischen Diharnstoffhydrochlorid, $2 (\text{H}_2\text{N})_2\text{CO} \cdot \text{HCl}$, Schmp: $95^\circ - 98^\circ$.

Arbeitet man mit $\text{SC}(\text{NH}_2)_2$, so gelangt man zum $\text{SC}(\text{NH}_2)_2 \cdot \text{HCl}$ (75, 76).

Methyl-mercapto-N-amino-sulfonyl-form-amidinium-chlorid,




Das einfachste Amidin, das sich von Methylrhodanid ableitet, ist S-Methyl-iso-thioharnstoff, $\text{H}_3\text{C-S-C(=NH)NH}_2$. Arndt (88) erhielt es 1921 durch Anlagerung von $\text{H}_3\text{C-SH}$ an Cyanamid



Es gelang nun, HCl und Sulfamid mit Methylrhodanid statt CH_3CN umzusetzen. Unter Feuchtigkeitsausschluß kristallisiert aus einer Lösung von ClH und Sulfamid in CH_3SCN in etwa 2 Tagen die sehr feuchtigkeitsempfindliche, frisch bereitet farblose, doch übelriechende Substanz mit 25 % Ausbeute



Im IR-Spektrum (IR 6) treten die NH, CH, C=N, SO_2 , N-C=N und N-S-N-Banden auf




IR 6

In CH_3OH , $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, Methyl-Äthyl-acetat, H_2O löst sich die Verbindung unter Zerfall; unlöslich in Äther, Acejon, Tetrahydrofuran. Bei Versuchen, das Amidin-hydro-chlorid in ähnlicher Weise wie Sulfamido-acet-immonium-chlorid aus

Alkohol mit Äther umzufüllen, wird nur Sulfamid zurückerhalten. Durch Extraktion mit Äther kann die Verbindung gereinigt werden. Trocknung im Hochvakuum führt zur Entfernung von Lösungsmittelresten. Selbst unter Stickstoff zersetzt sich die Verbindung langsam.

Sulfamid und Sulfurylchlorid in Acetonitril

Sulfamid mit Sulfurylchlorid umzusetzen, ist oft vergeblich versucht worden. Erst Bencker, Leiderer und Meuwsen (131) beobachteten 1962, daß Sulfamid in siedendem Acetonitril ($\sim 82^\circ$) sich mit O_2SCl_2 unter HCl -Abspaltung umsetzt. Beim Aufarbeiten erhält man nach NH_3 -Zusatz das in kaltem Wasser nur zu etwa 2 % lösliche $(\text{NH}_4\text{NSO}_2)_4$:



Das NH_4^+ -Salz wurde in das Ag^+ -Salz überführt, dieses in die CH_3 - bzw. C_2H_5 -Verbindung vom Schmp. 208° bzw. 240° (Zers.). Das Methyl-Derivat erwies sich als tetramer.

Appel und Goehring (82) gewannen erstmals aus der Umsetzung zwischen SO_3 und NH_3 in Nitromethan wenig des in heißem Wasser unlöslichen AgNSO_2 , das in die Methylverbindung (Schmp: 212°) überführt wurde. Nach kryoskopischen und ebullioskopischen Molekulargewichtsbestimmungen war die CH_3 -Verbindung tetramer.


Bencker, Leiderer und Meuwsen haben noch keine Angaben über den Reaktionsablauf zwischen Sulfamid und SO_2Cl_2 in siedendem CH_3CN gemacht; dies sollte jetzt nachgeholt werden.

Umsetzung von SO_2Cl_2 mit $(\text{H}_2\text{N})_2\text{SO}_2$ (Molverh. 1 : 1) in CH_3CN

Bei Raumtemperatur tritt auch nach 19 h Schütteln zwischen SO_2Cl_2 und Sulfamid in CH_3CN keine Reaktion ein. Auch Sulfaminsäurechlorid, $\text{H}_2\text{N}-\text{SO}_2\text{Cl}$ reagiert nach Appel und Berger (11) erst in siedendem Acetonitril mit Sulfamid. Dagegen erhielt Danner aus Harnstoff schon bei 20° mit SO_2Cl_2 in CH_3CN den Sulfuryldiharnstoff, $\text{SO}_2(\text{NHCONH}_2)_2$ (24).

Bencker, Leiderer und Meuwesen gewannen nach 18 h Erhitzen von Sulfamid mit SO_2Cl_2 in siedendem CH_3CN durchschnittlich 30 % Ausbeute an Ammoniumtetrasulfimid, $(\text{NH}_4\text{NSO}_2)_4$.

Das nach diesen Umsetzungen abdestillierte CH_3CN enthielt noch SO_2Cl_2 . Man kann annehmen, daß die zur Umsetzung angebotene Sulfamidmenge nicht ausreiche. Der bei der Umsetzung



freigesetzte HCl entweicht zum Teil. Er kann aber auch teilweise von Sulfamid in Acetonitril abgefangen werden. Sulfamid kann mit HCl zu 13 % zum Imidodisulfamid kondensiert werden



Das so verbrauchte Sulfamid geht für die Bildung von $(\text{NH}_4\text{NSO}_2)_4$ jedoch nicht verloren. Siegelin (19) erhielt aus Imidodisulfamid in siedendem CH_3CN mit etwa 10 % Ausbeute Tetrasulfimid; bei Anwesenheit von Sulfurylchlorid steigerte sich diese auf etwa 60 %.

Setzt man das NH_4 Tetrasulfimid mit SO_2Cl_2 in siedendem CH_3CN um, so tritt teilweise Zersetzung ein. Nach 24 h werden noch 20 - 25 % Tetrasulfimid zurückgewonnen. Diese Menge entspricht etwa der, die bei den Umsetzungen zwischen Sulfamid

und Sulfurylchlorid im Molverhältnis 1 : 1 erhalten wird.

Führt man die Reaktion von Sulfamid mit Sulfurylchlorid im Molverhältnis 1 : 2, also der doppelten Molmenge Sulfurylchlorid durch, so werden nur etwa 1 - 2 % $(\text{NH}_4\text{NSO}_2)_4$ erhalten. Bei seiner Darstellung muß also überschüssiges SO_2Cl_2 vermieden werden.

Vollzieht man nun die

Umsetzung von SO_2Cl_2 mit $\text{SO}_2(\text{NH}_2)_2$ im Molverhältnis 1 : 3 in siedendem CH_3CN , so tritt nach etwa 2 - 2,5 h Abscheidung ein. Nach 20 h Sieden beendet man die Umsetzung und destilliert Acetonitril ab. Zum Rückstand fügt man 20 m $\text{NH}_3/\text{CH}_3\text{OH}$, destilliert CH_3OH ab und nimmt in siedend heißem Wasser zu einer neutralen oder schwach ammoniakalischen Lösung auf. Beim Abkühlen gewinnt man $(\text{NH}_4\text{NSO}_2)_4$ mit etwa 60 % Ausbeute, bezogen auf das eingesetzte SO_2Cl_2 , oder 20 % Ausbeute, bezogen auf Sulfamid. Das nach der Umsetzung zurückgewonnene CH_3CN ist frei von SO_2Cl_2 ; das Sulfamid ist nur noch chromatographisch in geringer Menge nachweisbar. Neben Tetrasulfimid sind im Chromatogramm NH_4 Imidodisulfamid, $\text{NH}_4\text{N}(\text{SO}_2\text{NH}_2)_2$, Sulfamid-mono-sulfonat, $\text{H}_2\text{N}-\text{SO}_2-\text{N}(\text{NH}_4)\text{SO}_2\text{NH}_4$, Sulfamid-disulfonat $(\text{NH}_4\text{O}_3\text{SNH})_2\text{SO}_2$, NH_4 -Trisulfimid, $(\text{NH}_4\text{NSO}_2)_3$, Poly-sulfimid-sulfonate, $\text{H}_4\text{N}-\text{SO}_3-(\text{NH}-\text{SO}_2)_n\text{NH}_2$ zu erkennen.

Um die langkettigen Verbindungen möglichst zu unterdrücken, wird die Umsetzung von Sulfamid mit zutropfendem SO_2Cl_2 , also größerer Verdünnung vollzogen. Daher spielt das Verdünnungsprinzip nach Ruggli, Carotheers, Stoll und Ziegler (20) eine Rolle. $(\text{SO}_2\text{NNH}_4)$ muß aus einer langkettigen Verbindung entstehen. Die genannten Autoren beeinflussen den Reaktionsverlauf bei der Synthese makrozyklischer organischer Verbindungen durch Konzentrationsänderungen. Da eine zum Ringschluß führende Reaktion monomolekular ist, ändert sich bei Verdünnung die Wahrscheinlichkeit des Zusammentreffens der

beiden aktiven Gruppen in ein und derselben Verbindung nicht. Bei einer bimolekularen Verknüpfung zu Ketten nimmt die Möglichkeit der Kettenverlängerung mit steigender Verdünnung ab (21).




Abb. 5


Betrachtet man die Tetrasulfimid-Ausbeuten, die mit verschiedenen Molverhältnissen bei zutropfendem SO_2Cl_2 erhalten werden, so ergibt sich die folgende Übersicht:

Mol-Verh. $(\text{H}_2\text{N})_2\text{SO}_2 : \text{SO}_2\text{Cl}_2$	$(\text{NH}_4\text{NSO}_2)_4$ Ausbeute bezogen auf $(\text{H}_2\text{N})_2\text{SO}_2$	SO_2Cl_2
1 : 2	1 - 2 %	0,5 - 1 %
1 : 1	30 %	30 %
2 : 1	35 %	70 %
3 : 1	30 %	90 %

Steigerung der Ausbeute über die angegebenen Werte hinaus gelang trotz vieler Abwandlungen in der Durchführung nicht. Auch die Abhängigkeit der $(\text{NH}_4\text{NSO}_2)_4$ Ausbeute beim Molverhältnis 3 : 1 von der Reaktionszeit wurde geprüft. Eine Übersicht gibt die folgende Tabelle:


Reaktionszeit in Stunden	$(\text{NH}_4\text{NSO}_2)_4$ Ausbeute in %
4	5
8	13
16	58
20	87

Abhängigkeit
der $(\text{NH}_4\text{NSO}_2)_4$ -
Ausbeute von
der Reaktions-
zeit



Um Einblick in den zeitlichen Ablauf der $(\text{NH}_4\text{NSO}_2)_3$ -Synthese zu bekommen, wurde der Reaktionsablauf chromatographisch verfolgt. Es ergab sich dabei folgendes Bild (CH 1, CH 2):

Etwa 1 h nach Beginn der SO_2Cl_2 -Zufuhr (100 min nach Beginn der Probenentnahme für die Chromatographie) tritt Sulfamidmonosulfonat (SAMS) aus, das im Umsetzungsgemisch wohl als Sulfochlorid vorliegt.



1 1/4 Stunden nach Beginn finden sich auch Imidodisulfamid (ISA), Amidosulfat (AS), Sulfamid-disulfonat (SADS). Nach 1 3/4 h erscheinen $-(\text{O}_2\text{S}-\text{NH})$ -Ketten (PS) und Tetrasulfimid (TAS). Sulf-



amid nimmt immer mehr ab. Nach 6 h verschwindet auch Imido-disulfamid. Verbunden mit der Tetrasulfimid-Zunahme nehmen die kurzkettigen Moleküle immer mehr ab.

Faßt man zusammen, so laufen bei der Umsetzung von Sulfamid mit Sulfurylchlorid zum Tetrasulfimid nebeneinander zahlreiche Reaktionen ab:


Zunächst entstehen die noch unbekannten Sulfamid-sulfonsäurechloride




Sulfamidmonosulfonsäurechlorid reagiert weiter mit Sulfamid zum Sulfuryldisulfamid



Dieses kann sich nach Meuwesen und Papenfuß (22) sowie Kaiser (25) mit SO_2Cl_2 zum Tetrasulfimid umsetzen




oder unter NH_3 -Abspaltung bei Anwesenheit von HCl den Trisulfimid-ring schließen (22)





Siegelin (19) gelang es, Imido-disulfamid mit SO_2Cl_2 in Tetrasulfimid überzuführen:


Als letzter Reaktionsschritt wird bei allen Umsetzungen, die in diesem Gemisch zum Tetrasulfimid führen, ein Ringschluß des unbekannten Tri-imido-disulfonsäure-chlorids eintreten:







Die Vielzahl der nebeneinander ablaufenden Reaktionen soll die Übersichtstafel von Seite 31 veranschaulichen.





Mauwssen, Papenfuß, Kaiser








isoliert als NH_4 -Trisulfimid



?



isoliert als NH_4 -Tetrasulfimid



Übersicht über den Reaktions-
mechanismus der Tetrasulfimid-
synthese

V e r s u c h s t e i l

Die Lösungsmittel Äthanol-Methanol-Methylacetat-Pyridin wurden in üblicher Weise nach den in "OrganicSolvents" (18) gesammelten Vorschriften gereinigt. Benzol, Äther und Chloroform wurden nach Hesse, Wohlleben und Daniel (67, 68, 69, 70) durch adsorptive Filtration über Al_2O_3 entwässert. Man verfährt dabei wie folgt (Abb. 7):

Ein zylindrisches Glasrohr ($\varnothing$ 20 - 40 mm, Länge 300 - 600 mm), das an beiden Enden glatt abgeschnitten ist, steht auf einer Porzellansiebplatte. Ein Wattebausch, der in das Rohr gleichmäßig einge-drückt wird, schließt es am unteren Ende ab. Al_2O_3 (Fa. M. Woelm, Eschwege, Aktivität 1) wird unter leichtem, seitlichen Klopfen trocken eingefüllt. Die Säule soll, während die Flüssigkeit passiert, auch nicht zeitweise "trockenlaufen". Die Senkung des Wassergehaltes zeigt die Tabelle nach Wohlleben (68, 69, 70) Abb. 8.



Abb. 7

Lösungsmittel	Wasser- gehalt %	Filtration über Al_2O_3 "WOELM", Akt. I			Restwasser	
		g	Art	Säulen- ϕ mm	%	in Fraktion ml
Aceton	0,27	100	neutral	22	0,08	50 - 250
Äther	1,28	100	basisch	22	0,01	200 - 600
Benzol	0,07	25	basisch	15	0,004	100 - 2500
Chloroform	0,09	25	basisch	15	0,005	50 - 800
Essigäther	3,25	250	neutral	37	0,01	150 - 350

Abb. 8

Acetonitril der Firmen ID Riedel, E. de Haen, Seelze, Hannover, und E. Merck, Darmstadt, wurde gaschromatographisch auf Reinheit untersucht.

Den Herren Dr. Vitzthum und Dipl.-Chem. Hatz im hiesigen Institut für Organische Chemie (Vorstand: Professor Dr. G. Hesse) sei für Aufnahme und Deutung aller Gaschromatogramme (Gerät der Firma Perkin & Elmer, Bodenseewerk) herzlich gedankt. Die genannten Herren teilen darüber mit:

Acetonitril (I. D. Riedel, E. de Haen, Seelze, Hannover) (G CH 1)

Die Messung wurde unter folgenden Bedingungen ausgeführt: Temperatur: 100° , Trärgas: He, Strömung: 71 ml/min, Druck: 0,3 at, Säulenlänge: 2 m, Füllung: Dinonylphthalat.

Eingesetzte Menge: $15 \mu\text{l}$


Empfängerempfindlichkeit: 1/1, 1/128
1/8

Retentionszeiten und Verunreinigungen: 0,4 min : ?

1,4 min : H_2O

2,1 min : ?

2,8 min : CH_3CN



G CH 1

Der Wassergehalt beträgt etwa 5 ‰; wir verwendeten das Solvens ohne weitere Reinigung.

Auch CH_3CN von E. Merck, Darmstadt, wurde geprüft; es war ebenso wasserfrei.

Zur Wiedergewinnung des nach den Umsetzungen durch saure Bestandteile verunreinigten CH_3CN wurde wie folgt verfahren:

CH_3CN wurde unter ständigem Durchmischen mit verd. NaOH bis zur Neutralisation versetzt, die wässrige Phase im Scheidetrichter abgetrennt und das zurückbleibende CH_3CN jetzt über Nacht über P_4O_{10} getrocknet. Danach wird mit wenig frischem P_4O_{10} (etwa 5 g/l) versetzt und über eine Kolonne mit starker Rückflußquote abdestilliert. Eine weitere Destillation ohne Zusatz von Trockenmittel schloß sich an. Die gaschromatographischen Daten (G CH 2):

Temperatur: 70 °

Trägergas: He

Strömung: 6,9 ml/min

Druck: 0,33 at


Säulenlänge: 2 m

Füllung: Tetraacetylphthalat

eingesetzte Menge: 5 μ l

Empfängerempfindlichkeit: 1/2

$$t_{\text{ret}, \text{CH}_3\text{CN}} = 11,3$$



G CH 2

In dem wiedergewonnenen Präparat ist keine Verunreinigung.

Propionitril, $\text{C}_2\text{H}_5\text{CN}$, rein (Schuchardt GmbH) wurde ohne weitere Prüfung verwandt.

Cyanessigsäure-methylester, $\text{NC-CH}_2\text{-CO-OCH}_3$, rein, wurde von der selben Firma bezogen und ohne weiteres zur Umsetzung herangezogen.

Cyanessigsäure-äthylester,

$\text{NC-CH}_2\text{-CO-OC}_2\text{H}_5$, Reinheit

LAB, der Firma E. Merck,

Darmstadt, wurde gaschro-

matographisch geprüft

(G CH 3) und trotz ge-

ringer Verunreinigungen

ohne weiteres verwendet.

Eingespritzte Menge: $5\mu\text{l}$

Trägergas: He

Strömung: 50 ml in 31 sec

Temperatur: 170°

Druck: 0,55 atü

Säule: Länge 2 m

Füllung: Didecylphthalat

Det. Spannung: 5 V


Empfindlichkeit: 2



G CH 3

Methylrhodanid, CH_3SCN (62, 71). 97 g (1 Mol) KSCN wurden in 50 ml H_2O gelöst und im Verlauf von 15 min drei Portionen von insgesamt 125 g (1 Mol) Dimethylsulfat, $(\text{CH}_3\text{O})_2\text{SO}_2$, unter kräftigem Rühren und Eiskühlung zugefügt. Nach kurzem Erwärmen und Durchmischen im kochenden Wasserbad wird das Ganze in einen Scheidetrichter gebracht. Dabei sammelt sich das gebildete CH_3SCN als leichte Ölschicht oben; es wird abgetrennt, mit CaCl_2 über Nacht getrocknet und destilliert. Die Ausbeute beträgt 59 g (80 - 81 %) (G CH 4)

Eingespritzte Menge: $5\mu\text{l}$
 CH_3SCN
 Temperatur: 121°
 Trägergas: He
 Druck: 2 atü
 Säule: Länge 4 m
 Füllung: Polyäthylenglykol
 Empfindlichkeit: 8
 CH_3SCN ($t_{\text{ret}} = 7,6 \text{ min}$)
 ist rein



Harnstoff, Thioharnstoff und Urethan wurden ohne weitere Reinigung verwandt. Für Leitfähigkeitsmessungen wurde zweimal langsam über eine Kolonne destilliert. Bei der zweiten Destillation durchperlte trockener N_2 das SO_2Cl_2 . Ausbeute: 60 - 70 %.

Chlorwasserstoff wurde freundlicherweise von der BASF, Ludwigshafen, kostenlos überlassen, wofür herzlich gedankt sei.

Bromwasserstoff (74); zu 1 Gew. Teil roten P und 2 Gew. Teilen H_2O , in einem Kolben mit Gasableitungsrohr befindlich, tropft man aus einem Tropftrichter langsam 10 Gew. Teile Brom (1 ml = 3 g Brom). Von mitgerissenen Br_2 -Dämpfen befreit man das Gas in einem mit feuchtem roten P auf Glaswolle beschickten U-Rohr. Der BrH wird in einem mit flüssiger Luft gekühlten Schlenkrohr kondensiert.

Sulfamid, $(\text{H}_2\text{N})_2\text{SO}_2$; tropft man SO_2Cl_2 , gelöst in abs. CH_2Cl_2 zu flüssigem NH_3 , so entsteht Sulfamid (48).

Aus dem getrockneten Reaktionsgut wird $(\text{H}_2\text{N})_2\text{SO}_2$ mit heißem Methylacetat extrahiert. Ausbeute: 55 - 60 %. Zur weiteren Reinigung kristallisiert man aus Methylacetat um. Schmp: 91° bis 92° .

"Sulfamid purum" der Fluka AG, Buchs, Schweiz, enthielt noch Reste organischer Lösungsmittel sowie geringe mechanische Verunreinigungen. Sein Schmp: 91° - 94° . Es ist Cl^- -frei. Gehaltsbestimmungen wurden nach Joseph (60) gasvolumetrisch durch Umsetzung mit alkalischer Hypobromitlösung durchgeführt - 1 ml N_2 = 4,3 mg $(\text{H}_2\text{N})_2\text{SO}_2$. Es erwies sich als 98,5 prozentig und wurde so für die Umsetzung verwendet.

Kalium-imido-disulfamid, $\text{KN}(\text{SO}_2\text{NH}_2)_2$ wird nach Joseph (66) dargestellt. Durch eine Lösung von 48,0 g (0,5 Mol) Sulfamid in 500 ml 0,5 n KOH leitet man solange H_2O -Dampf, bis kein NH_3 mehr entweicht. Bei 40° und 12 - 15 Torr wird die Lösung bis zur beginnenden Kristallisation eingeeengt und $\text{KN}(\text{SO}_2\text{NH}_2)_2$ durch Methanol als schuppige Substanz abgeschieden. Mit Methanol und Äther wäscht man nach. Ausbeute: 45 - 50 g (84 - 94 %).

160,0; 83,5 mg Sbst.

341,7; 184,1 mg BaSO_4

$\text{KN}(\text{SO}_2\text{NH}_2)_2$

Ber: S 30,0

(213)

Gef: 29,3; 30,3

Imido-disulfamid, $\text{HN}(\text{SO}_2\text{NH}_2)_2$ stellten wir nach Leiderer (65) durch 4stündiges Schütteln von 21,3 g (0,1 Mol) $\text{KN}(\text{SO}_2\text{NH}_2)_2$ mit 200 ml einer 10proz. absolut-methanolischen HCl dar. Man filtriert von KCl und destilliert CH_3OH und überschüssigen ClH bei etwa 21° und 12 - 15 Torr. Der Rückstand wird mit 30 ml Aceton aufgenommen und filtriert. In 400 ml abs. Benzol eingetropft, erhält man sich gut absetzende Kristallblätter, die über KOH im Vakuum getrocknet werden. Schmp: 159° 312,5; 131,2 mg Sbst. benötigen 17,3; 7,3 ml 0.1 n NaOH
Gef: 308,0; 128,1 mg $\text{HN}(\text{SO}_2\text{NH}_2)_2$

Ammonium-trisulfamid, $(\text{NH}_4\text{NSO}_2)_3$ wird nach Joseph (66) durch thermische Umlagerung von Sulfamid (2,0 g - 208 mMol je Reagensglas) bei genauer Temperaturkontrolle erhalten. Im Verlauf 1 h heizt man im Ölbad auf 92° (Schmp.). In weiteren 2 h steigert man auf 120° und dann auf 200° , wo man 4 h hält. Die erhaltenen Schmelzen werden in je 5 ml H_2O aufgenommen und filtriert. Beim Zutropfen von CH_3OH zu den vereinigten Filtraten scheidet sich $(\text{NH}_4\text{NSO}_2)_3$ mit 90 - 92 % Ausbeute ab.

107,1; 85,7 mg Sbst.	258,3; 207,1 mg BaSO_4
87,1; 95,2 mg Sbst.	11,8; 12,75 ml 0.1n H_2SO_4
$(\text{NH}_3\text{HNSO}_2)$	Ber: S : 33,4 $\text{N}_{\text{NH}_4} +$: 18,8
96	Gef: 33,2; 33,3 18,7; 19,0

Dimethyl-sulfamin-säurechlorid, $(\text{CH}_3)_2\text{N-SO}_2\text{Cl}$ (77, 54)

Man läßt unter Wasserausschluß zu 65 g (0,8 Mol) $(\text{CH}_3)_2\text{NH}_2\text{Cl}$ 216 g (1,6 Mol) frisch destilliertes SO_2Cl_2 auf einmal zulaufen. Dann wird 18 h auf 65° und schließlich 2 h auf 90° am Rückflußkühler erhitzt. HCl entweicht in Strömen. Das Reaktionsgut wird im Ölbad destilliert, wobei überschüssiges O_2SOCl_2 mit dem Vorlauf übergeht. Die Rohausbeute beträgt 107 g Sdp: $74 - 78^\circ/12$ Torr. Durch nochmaliges Destillieren erhält man die reine Verbindung. Ausbeute 90 g (etwa 80 %); Sdp. $73 - 74^\circ/12$ Torr.

248,7; 122,6 mg Sbst. benötigen	16,95; 7,46 ml 0.1 n SO_4H_2
$(\text{CH}_3)_2\text{SO}_2\text{Cl}$	Ber: N 9,8
(144)	Gef: 9,7; 9,7

Asym. Dimethylsulfamid, $(\text{CH}_3)_2\text{N-SO}_2\text{-NH}_2$ (54)

Über 14,4 g (0,1 Mol) $(\text{CH}_3)_2\text{N-SO}_2\text{Cl}$, das sich in dünner Schicht auf dem Boden eines 1 l-Erlenmeyerkolbens befindet, leitet man 2 h unter Wasserausschluß trockenes NH_3 . Unter Erwärmen und allmählichem Erstarren des Gemisches tritt Reaktion ein. Sie wird vervollständigt durch Stehenlassen über

Nacht in einer NH_3 -Atmosphäre. Das gepulverte Reaktionsgut wird dreimal je 30 min mit jeweils 250 ml Äther kalt extrahiert. Die vereinigten ätherischen Lösungen werden stark eingeeengt. Beim Abkühlen auf -20° fällt das Präparat in großen Kristallen an. Sie werden mit wenig Äther gewaschen. Ausbeute : 9,4 g (73 %)

Löst man die Verbindung in 300 ml reinem Toluol und engt auf etwa das halbe Volumen ein, so kristallisiert sie im Eisschrank in schönen, cm-langen Nadeln von Schmp 97° . Ausbeute: 8,65 g (70 %)

Unsym. Dimethylsulfamid ist in Wasser und Alkohol leicht, in Äther, Benzol und Toluol schwer löslich.

Monobutyl-sulfamid, $\text{C}_4\text{H}_9\text{-NH-SO}_2\text{-NH}_2$ (78, 51)

11,5 g (0,12 Mol) Sulfamid werden mit 7,3 g (0,1 Mol) Butylamin und 20 ml Wasser unter Rückflußkühlung 5 h auf 110° bis 120° erhitzt. Dabei spaltet laufend NH_3 ab. Der größte Teil des entstandenen Butylsulfamids wird durch Abkühlen der Lösung auf 0° als meist reine Verbindung gewonnen. Weitere 1,5 - 2,0 g können aus dem Filtrat mit Äther extrahiert werden. Die Verbindung wird aus wenig Wasser oder Benzol umkristallisiert. Ausbeute: 10,2 - 10,5 g (56 - 58 %) vom Schmp: 52° . Farblose Blättchen, die in Alkohol, Äther, Aceton, CH_2Cl_2 gut löslich sind.

Sym. Dibutyl-sulfamid, $(\text{C}_4\text{H}_9\text{-NH})_2\text{SO}_2$

in einen 500 ml Dreihalskolben, der mit Rührer, Tropftrichter und Rückflußkühler ausgestattet ist, gibt man 15,0 g (0,11 Mol) SO_2Cl_2 und 100 ml CH_2Cl_2 . Dazu läßt man innerhalb 45 - 60 min bei 5° eine Lösung von 32,5 g (0,45 Mol) Butylamin in 150 ml wasserfreiem CH_2Cl_2 tropfen. Während der Reaktion bleibt die Lösung unverändert klar, danach wird CH_2Cl_2 abdestilliert und der Rückstand zur Entfernung des

$(C_4H_9NH_3)Cl^-$ in wenig Wasser aufgeschwemmt. Das ungelöste Dibutylsulfamid wird abfiltriert und aus Wasser umkristallisiert. Schmp: $128^\circ - 129^\circ$; Ausbeute: 11,5 g (50 %).

Ammonium-amidosulfat, $H_2N-SO_3NH_4$

19,4 g (0,2 Mol) H_2N-SO_3H werden mit wässrigem NH_3 neutralisiert und die klare Lösung mit Isopropanol versetzt. Dabei scheiden sich große Plättchen des NH_4 -Salzes ab. Ausbeute: 16,2 g (etwa 70 %)

111,8; 92,8 mg Sbst.	9,8; 8,1 ml 0.1n SO_4H_2
$H_2N-SO_3NH_4$	Ber: $N_{NH_4}^+$: 12,3
(114)	Gef: 12,3; 12,2

NH_4 -Imido-disulfonat, $HN(SO_3NH_4)_2$

Ein Gemisch von je 2 g (20,6 m Mol) H_2N-SO_3H und (17,5 Mol) $H_2NSO_3NH_4$ wird im Heizbad auf $145 - 150^\circ$ erhitzt. Das Ganze schmilzt, um nach einigen Minuten zu erstarren. Der Schmelzkuchen wird zerrieben, in 50 ml Methanol suspendiert, mit 2 n NH_3 genau neutralisiert und zum Sieden erhitzt. Beim Abkühlen der filtrierten Lösung fallen leicht wasserlösliche Kristalle an, die mit Alkohol, dann Äther gewaschen und getrocknet werden. Ausbeute: 2,5 g (60 %)

126,9; 123,6 mg Sbst. benötigen	18,0; 18,5 ml n/10 HCl
$HN(SO_3NH_4)_2$	Ber: N 19,9
(211)	Gef: 19,9; 20,2

Acetamidin-hydrochlorid, $H_3C-C(=NH_2^+Cl^-)NH_2$ (80, 81, 47)

In eine Lösung von 100 g (2,44 Mol) sorgfältig getrocknetem Acetonitril in 113 g (2,5 Mol) abs. Äthanol, die sich in einer gewogenen (1 l) Saugflasche befindet, leitet man unter Kühlen mit Eis/Kochsalz trockenen HCl ein, bis eine Gewichtszunahme von 95 g (2,6 Mol) erreicht ist. Meist ist die Umsetzung nach 4 h beendet; sie läßt sich zeitlich abkürzen, wenn man das Gemisch während der Reaktion gut durchrührt.

Nachdem die Saugflasche mit CaCl_2 -Rohr versehen worden ist, bleibt das Gemisch bis zur Abscheidung einer festen Kristallmasse stehen, was gewöhnlich 2 - 3 Tage dauert. Inzwischen stellt man sich eine Lösung von trockenem NH_3 in abs. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ her, deren Gehalt durch Titration bestimmt wird und mindestens 9 % NH_3 enthalten soll.

Das feste, anhaftende Acet-imino-äther-hydrochlorid, $\text{H}_3\text{C}-\text{C}(=\text{NH}_2^+\text{Cl}^-)\text{OC}_2\text{H}_5$ wird nun aus der Saugflasche herausgebrochen und in einem trockenen Mörser mit 100 ml abs. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ zu einer Paste verrieben, die man wieder in die Saugflasche zurückgibt. Man rührt nunmehr nach Zugabe eines Überschusses der alkoholischen NH_3 -Lösung (500 ml der 9 %igen Lösung oder der äquivalenten Menge einer konz. Lösung), wobei der Kristallbrei langsam in Lösung geht, sich jedoch NH_4Cl abscheidet. Nach dreistündigem Rühren wird das NH_4Cl abgenutscht, das Filtrat auf dem Dampfbad auf ~ 200 ml eingeengt, wobei bereits starke Kristallabscheidung einsetzt. Beim Abkühlen kristallisiert weiterhin Amidin-hydrochlorid in langen, farblosen Prismen. Sie werden abgesaugt, mit 100 ml abs. kaltem $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ gewaschen und im Exsikkator über konz. H_2SO_4 getrocknet. Beim Einengen der Mutterlauge wird noch eine weitere Menge erhalten. Schmp: $164^\circ - 166^\circ$; Ausbeute: 185 - 210 g (80 - 91 %); leicht löslich in Alkohol und Wasser.

Analytisches

C-H-Analysen und N-Mikrobestimmungen wurden von Herrn Zankl im hiesigen Institut für Organische Chemie (Vorstand: Prof. Dr. G. Hesse), von Frau Ruyter und Fräulein Kleeberger im hiesigen Institut für Anorganische Chemie (Abtlg. Prof. Dr. Behrens) durchgeführt, wofür vielmals gedankt sei. Zudem sind C, H, N und S-Mikroanalysen im Mikroanalytischen Laboratorium Ilse Beetz in Kronach durchgeführt worden.

Zur N-Bestimmung wurde die Einwaage mit Se-Reaktionsgemisch (500 Tl. Na_2SO_4 , 8 Tl. CuSO_4 , 8 Tl. Se) nach Wieninger (83) (bezogen von E. Merck, Darmstadt), aufgeschlossen. Aus dem entstandenen NH_4^+ wird mit konz. Lauge NH_3 entbunden und mit H_2O -Dampf in überschüssige 0.1 n H_2SO_4 destilliert.

Zur S-Bestimmung wird mit konz. ClH und einer Spatelspitze NaNO_2 auf dem Wasserbad erhitzt, dann nach Hahn (84) aus großer Verdünnung BaSO_4 gefällt, gewaschen, bei 110° getrocknet und 15 min bei 800° geglüht.

Chlorid wurde aus HNO_3 -Lösung nach Fajans mit Adsorptions-indikator ermittelt, NH_4^+ wurde mit der Formoltitration erfaßt.

Gasvolumetrische N_2 -Bestimmung. Der N-Gehalt von $(\text{H}_2\text{N})_2\text{SO}_2$ läßt sich wie beim $(\text{H}_2\text{N})_2\text{CO}$ gasvolumetrisch ermitteln. Wir bestimmten den Sulfamid-N in hydrolysiertem Sulfamido-acet-immonium-chlorid sowie in Harnstoff-hydrochloriden nach der von Joseph (66) für Sulfamid gegebenen Vorschrift wie folgt: In einen Schenkel des Zerewitinoffkolbens wird die Substanz eingewogen und zur Hydrolyse mit 5 ml H_2O versetzt. Dann füllt man in den anderen Schenkel 10 ml frisch bereitete Na-Hypobromitlösung. Das Reaktionsgefäß verbindet man mit

einer Bunte-Bürette (Abb. 9). Sind die Luftdruckunterschiede in der Anordnung beseitigt, senkt man das Niveaugefäß, um einen leichten Unterdruck zu erzeugen.

Dann vereinigt man die Lösungen in den beiden Schenkeln des Kolbens, spült ein paarmal hin und her und schüttelt solange, bis der Meniskus in der Bürette nicht




Abb. 9

mehr weitersinkt, die N_2 -Entwicklung also beendet ist. Das Reaktionsgefäß wird wieder auf die Anfangstemperatur gebracht. Dann liest man das entstandene N_2 -Volumen ab. Es wird auf 0° und 760 Torr reduziert; $1 \text{ ml } N_2 = 4,3 \text{ mg } (H_2N)_2SO_2$.

Papierchromatographie der Schwefel(VI)-Stickstoffverbindungen

Zum qualitativen Nachweis der entstandenen S-N-Verbindungen wurde das von Lehmann und Kempe (85) entwickelte papierchromatographische Verfahren benutzt. Es wurde sowohl mit der eindimensionalen, als auch der von uns daraus abgeleiteten zweidimensionalen Methode aufsteigend gearbeitet (auf nicht vorbehandeltem Papier Nr. 2043 a der Firma Schleicher und Schüll, Dassel). Zur Trennung der Gemische wurden die beiden von Lehmann und Kempe angegebenen Lösungen (FL) verwendet.

Fl 1: 68,5 ml Dioxan; 31,4 ml Wasser; 1 ml konz. NH_3/H_2O
 Fl 2: 40,0 ml Äthanol; 30 ml Isopropanal; 29 ml Wasser;
 1 ml NH_3/H_2O

Die Laufzeit betrug bei Raumtemperatur 12 - 14 h. Beim zweidimensionalen Verfahren wurde erst 12 h mit Fl 1, dann nach dem Trocknen senkrecht dazu 12 h mit Fl 2 gearbeitet.

Nach dem Trocknen werden die Chromatogramme 90 min mit nitrosen Gasen behandelt. Dabei entsteht aus den N-S-Verbindungen quantitativ Sulfat. Darauf wird bei 100° ausgeheizt, mit einer 1 m $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ -Lösung besprüht und getrocknet. Durch Baden in destilliertem Wasser beseitigt man den $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ -Überschuß. Die Chromatogramme werden dann erneut getrocknet und mit Na_2S -Lösung besprüht. Dabei erscheinen die PbSO_4 -Flecke als schwarzes PbS auf braungetöntem Hintergrund.

Die Rf-Werte sind nach Zimmermann (86) abhängig vom Fließmittel (Fl), der Papiersorte, der Sättigung der Kammeratmosphäre durch Lösungsmitteldämpfe, der Entfernung der Startlinie von der Eintauchzone. Weiter spielen Begleitstoffe, Temperatur und Konzentration der aufgetragenen Substanzen eine Rolle (nach Grüne - 87). Daher waren auch die Rf-Werte bei unseren Versuchen nicht reproduzierbar. Zur Identifikation wurden Testgemische und bei zweidimensionalem Arbeiten Mischchromatogramme herangezogen.

Für die Testlösungen wurden Substanzmengen so bemessen, daß jede S-N-Verbindung bei der Zersetzung durch nitrose Gase die gleiche Menge Sulfat liefert. Vom Testgemisch wurden 3 μl als 0.1 m Lösung (bezogen auf S) mit einer Blutzuckermischpipette aufgetragen (je Substanz 9,6 S). Testgemisch 1 (T 1) enthält

Sulfamid	$(\text{H}_2\text{N})_2\text{SO}_2$	SA
NH_4 -Imidodisulfamid	$\text{NH}_4\text{N}(\text{SO}_2\text{NH}_2)_2$	ISA
NH_4 -Amidosulfat	$\text{NH}_2\text{SO}_3\text{NH}_4$	AS
Sulfuryldisulfamid	$\text{SO}_2(\text{NH}_2\text{SO}_2\text{NH}_2)_2$	SDS
Sulfat	$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$	S
Trisulfimid	$(\text{NH}_4\text{NSO}_2)_3$	TIS

Testgemisch 2 enthält

Sulfamid	$(\text{H}_2\text{N})_2\text{SO}_2$	SA
NH_4 -Imidodisulfamid	$\text{NH}_4\text{N}(\text{SO}_2\text{NH}_2)_2$	ISA
NH_4 -Amidosulfat	$\text{NH}_2\text{SO}_3\text{NH}_4$	AS
Sulfamid-Disulfonat	$\text{SO}_2(\text{NNH}_4\text{SO}_3\text{NH}_4)_2$	SADS
Sulfat	$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$	S
NH_4 -Trisulfimid	$(\text{NH}_4\text{NSO}_2)_3$	TIS
NH_4 -Tetrasulfimid	$(\text{NH}_4\text{NSO}_2)_4$	TAS


Weitere häufig auftretende Verbindungen

Sulfamid-Monosulfonat	$\text{H}_2\text{NSO}_2\text{N}(\text{NH}_4)\text{SO}_3\text{NH}_4$	SAMS
NH_4 -Imidodisulfonat	$\text{HN}(\text{SO}_3\text{NH}_4)_2$	IDS
Polysulfimid-sulfonate	$\text{NH}_4\text{OSO}_2-(\text{NHSO}_2)_{4-6}\text{ONH}_4$	PS

Zweidimensionale Chromatogramme


Die Chromatogramme sind bei der Auftrennung der Umsetzungsprodukte zwischen Sulfamid und Sulfurylchlorid durch die Vielzahl der auftretenden Verbindungen überlastet; die Gefahr einer unvollständigen Auftrennung besteht. Es wurde daher aus dem eindimensionalen Verfahren von Lehmann und Kempe (loc. cit) ein zweidimensionales Verfahren zur Trennung der S (VI)-N-Verbindungen entwickelt.

Zunächst wird 12 h aufsteigend in Fl 1 gearbeitet, dann getrocknet und nun senkrecht dazu in Fl 2 wieder aufsteigend 12 h chromatographiert. Auf ein mitlaufendes Testgemisch muß bei dieser Arbeitsweise verzichtet werden, es sei denn, man fertigt Mischchromatogramme an, um so die Identität zweier Substanzen festzustellen. Dieser Weg wurde von uns zur Trennung von Sulfat, Trisulfimid, Sulfamid-disulfonat und Sulfuryldisulfamid auf dem gleichen Chromatogramm angewandt. (CH 3) wurde aus Testgemisch 1 erhalten (SA,



CH 3
I: eindim. Fl 1 LZ 12 h aufgetragen: 3 µl : T 1
II. Zweidimensional aufgetragen: 3 µl : T 1

ISA, AS, SDS, TIS, S). Dem Testgemisch 1 wurde in einem weiteren Versuch SAMS beigemischt, um auch dessen Lage am Chromatogramm zu fixieren (CH 4).



CH 4
aufgetragen 3 µl T₁ + SAMS

V o r v e r s u c h e

Löslichkeit von Sulfamid in Acetonitril

Zur Bestimmung wurde in ~ 100 ml CH_3CN Sulfamid in einem Dreihalskolben bis zum Bestehenbleiben des Bodenkörpers eingerührt. Die ganze Anordnung befand sich in einem Thermostaten. Nach etwa 30 min Rühren läßt man 10 min bis zur Probenentnahme von jeweils 5 ml Lösung verstreichen, damit sich alles ungelöste Sulfamid absetzt. Man pipettiert in einen Pt-Tiegel ab und beläßt den Rückstand vor dem Wiegen nach Verdunsten des CH_3CN noch 4 h bei Raumtemperatur, 12 mm über P_4O_{10} .

Eine Übersicht über die gefundenen Werte gibt die Tabelle:

Temp. in °C	Sulfamid in 5 ml Lösung	Sulfamid in 100 ml Lösung	Mittel- wert	Sulfamid in Mol/Liter
	mg	g	g	Mol/l
20	394,5 379,1	7,89 7,56	7,73	0,81
25	475,4 488,5	9,50 9,76	9,63	1,00
30	542,0 534,0	10,84 10,68	10,72	1,18
35	607,9 609,6	12,18 12,20	12,19	1,31
40	760,5 760,5	15,21 15,20	15,21	1,58
45	851,1 864,6	17,02 17,29	17,15	1,78
50	1150,3 1132,6	23,01 22,65	22,83	2,38
55	1402,9 1401,3	28,06 28,03	28,05	2,92
65	2106,6 2319,7	42,13 46,39	44,25	4,62

Leitfähigkeitsmessungen

Um festzustellen, ob $(\text{H}_2\text{N})_2\text{SO}_2$ bzw. Cl_2SO_2 ionisch oder molekular gelöst in CH_3CN vorliegen, führten wir Leitfähigkeitsmessungen mit der Gerät-Type LBR der Wissenschaftlich-Technischen Werkstätten GmbH (Weilheim/Obb) durch. Von technischen Einzelheiten abgesehen, stellt die Anordnung (Abb. 14) eine Wheatstonesche Brücke dar, die von einem Schwingungsgenerator als Wechselstromquelle gespeist wird (30 bzw. 300 Hz).




Abb. 14
Schaltskizze für Leitfähigkeitsmessung

Die Konstante der Meßzelle wurde mittels einer 0.1 n KCl-Lösung ermittelt. Sie wurde durch Einwiegen von 746 mg KCl (E. Merck, Darmstadt) auf 100 ml Leitfähigkeitswasser erhalten. Der Ohmwert der damit gefüllten Zelle,

multipliziert mit dem bekannten reziproken Wert des spez. Widerstandes $1/\rho$ einer 0.1 n KCl-Lösung (bei Meßtemperatur), ergibt die Widerstandskapazität des Gefäßes:

$$R = \rho \cdot K; \quad K = 1/\rho \cdot R (\text{Raumtemp.: } 23^\circ) \\ 1/\rho (23^\circ) = 0,1239$$

Widerstand (R) der 0.1 n KCl-Lösung: 74 (Meßfrequenz 300 Hz).

Für die spez. Leitfähigkeit der zu untersuchenden Lösungen gilt:

$$= K / R$$

Sulfamid in CH_3CN (23°C)

c in g/l 10^{-1}	R in $\Omega \cdot 10^3$	κ in $\Omega^{-1} \cdot 10^{-5} \text{cm}^{-1}$
0,000	50	1,83
0,167	48	1,91
0,334	45	2,02
0,668	43,6	2,10
1,000	41,8	2,19
1,840	38,2	2,39
3,500	29,8	3,08

Sulfamid in H₂O (23 °C)

c in g/l 10 ⁻¹	R in Ω 10 ³	α in Ω ⁻¹ cm ⁻¹ 10 ⁻⁵
0,000	5,44	1,69
0,167	5,90	1,65
0,500	4,35	2,11
0,834	3,87	2,37
1,165	2,87	3,17
1,670	2,67	3,42
2,170	2,18	4,20
2,604	1,82	5,05


Sulfurylchlorid in CH₃CN (23 °C)

c in g/l 10 ⁻¹	R in Ω 10 ³	α in Ω ⁻¹ cm ⁻¹ 10 ⁻⁵
0,00	59,20	1,55
0,56	26,30	3,49
1,13	11,00	8,30
1,72	8,30	11,00
2,23	5,60	16,40
2,80	4,30	21,30
3,40	3,90	23,60
3,89	3,70	24,70
4,45	3,60	25,30
5,10	3,57	25,70
5,50	3,57	25,70
6,80	3,45	26,40
7,25	3,45	26,40
7,62	3,45	26,40
8,35	3,45	26,40

Verhalten von Sulfamid und CH_3CN

- a) 5 g Sulfamid werden in 100 ml kaltem Acetonitril gelöst. Die völlig klare Lösung, die ihre Farbe nicht ändert, wird einen Monat bei Raumtemperatur sich selbst überlassen. Danach ist das CH_3CN zum Großteil verdunstet. Die abgeschiedenen Kristalle werden mit reinem CH_3CN (0°), dann Äther ausgewaschen und im Vakuum (12 Torr, 20° , P_{4010} , 24 h) von anhaftendem Solvens befreit. Auswaage 5,0 g Schmp: $88-90^\circ$
 47,5; 34,0 mg Stbst. 115,7; 83,2 mg BaSO_4
 $(\text{H}_2\text{N})_2\text{SO}_2$ Ber: S 33,4
 (96) Gef: 33,4; 33,5

- b) Eine Lösung von 1 g $(\text{H}_2\text{N})_2\text{SO}_2$ (Schmp: 92°) in 25 ml reinem CH_3CN wurde 18 h, geschützt vor Luftfeuchtigkeit, im Ölbad zum Sieden erhitzt. 18 h danach wurde bei Raumtemperatur und 12 Torr abdestilliert, bis der Rückstand staubtrocken war. Es hinterblieben 970 mg bzw. 950 mg Substanz vom Schmp $90-92^\circ$, deren chromatographische Untersuchung (CH 5) nur den Sulfamidfleck zeigte.



CH 5

Fl 1 LZ 12 h

Bahn I: 5 μl Reaktions-
 produkt in $\text{NH}_3/\text{H}_2\text{O}$


Bahn II: 3 μl T 1

Reaktion von Sulfamid mit HCl in siedendem Acetonitril

7,6 (~ 80 m Mol) wurden 24 h in 25 ml CH_3CN erhitzt und trockener ClH eingeleitet. Nach Abdestillieren des CH_3CN

hinterblieb ein schwach braungefärbter zäher Rückstand, der in wässriger Lösung eine in 2 n HCl unlösliche Ba^{2+} Fällung gibt. Das Chromatogramm (CH 6) zeigt an: Sulfamid, Imidodisulfamid sowie wenig Amidosulfat, Sulfuryldisulfamid, zwei nicht näher identifizierte Substanzen und Sulfat.

Zur Isolierung von Imidodisulfamid wurde der zähe Rückstand mit 10 ml Aceton behandelt, die erhaltene Lösung filtriert und unter kräftigem Rühren bei Raumtemperatur langsam 200 ml Benzol zugeotropft. Die Ausfällung wird mit Benzol gewaschen und getrocknet; farblose Kristalle vom Schmp: 155 - 157 °; Ausbeute: 0,9 g (~ 13 %) 170,1; 159,3 mg Subst. benötigen 7,75; 9,10 ml 0.1 n NaOH
Gef: 171,0; 159,0 mg
 $\text{HN}(\text{SO}_2\text{NH}_2)_2$



Fl 1; 12 15 h
Bahn I: Umsetzungsprodukte
Bahn II: 3 µl T 1

Gaschromatographische Untersuchung des CH_3CN nach der Umsetzung zwischen $(\text{H}_2\text{N})_2\text{SO}_2$ und Cl_2SO_2 (Molverhältnis 3 : 1)

CH_3CN , das als Solvens für Umsetzungen zwischen Sulfamid und SO_2Cl_2 (Molverhältnis 3 : 1) gedient hat, wurde von Herrn Dr. Vitzthum im hiesigen Institut für Organische Chemie

(Vorstand Prof. Dr. G. Hesse) gaschromatographisch auf chlorierte Acetonitrile untersucht.

Retentionszeit von

Cl-CH₂CN: (Th.

Schuchardt GmbH,
München)

Temperatur 150 °

Trägergas: He

Strömung 5,3 ml/min

Druck: 2,0 atü

Säulenlänge: 1 m

Säulenfüllung: 4 m

Polyäthylenglykol

(MG 4000);


eingespritzte Menge:

10 µl

Empfängerempfindlich-

keit: 1/8 (GCH 5)

t_{Ret}, ClCH₂CN: 17,8 min



G CH 5

Retentionszeit von ClCH₂CN

Reinheit von CH₃CN nach Umsetzungen von (H₂N)₂SO₂
und SO₂Cl₂ (Molverhältnis: 3 : 1)

Alle Meßdaten wie vorstehend

außer Menge: 40 µl

Empfängerempfindlich-


keit: 1/5; 1/2; 1/6; 1/1

Es finden sich zwei Peaks

(G CH 6)

1) t_{ret} = 2,8 min: CH₃CN
(vergl. Seite 33 G CH 1)

2) t_{ret} = 17,5 min: Mono-
chloracetonitril (vgl.
G CH 5)



G CH 6

Prüfung auf ClCF₂CN in CH₃CN nach

Umsetzung von Sulfamid mit SO_2Cl_2 im Molverhältnis 3 : 1
in diesem Solvens.

Planimetrische Auswertung des Peaks bei 17,5 min (G C 6)
ergibt einen Gehalt von 0,5 ‰ ClCH_2CN .


Sulfurylchlorid in siedendem Acetonitril

41 g (1 Mol) CH_3CN werden mit 13,5 g (0,1 Mol SO_2Cl_2)
unter Rückfluß 24 h zum Sieden erhitzt. Schon kurz nach Er-
reichen der Siedetemperatur (nach etwa 15 min) tritt kräftige
 Cl_2 -Entwicklung ein. Nach weiteren 15 min entweicht kein Cl_2
mehr. Diese Cl_2 -Entwicklung tritt etwa nach der gleichen Zeit
bei Umsetzungen zwischen Sulfamid und SO_2Cl_2 in siedendem CH_3CN
ein.

Nach 24 h Sieden wird das Gemisch aus CH_3CN und
 SO_2Cl_2 abdestilliert; der Sdp. beträgt dabei $59^\circ - 60^\circ$. Der
bräunliche, zähflüssige Rückstand wird mit $\text{NH}_3/\text{H}_2\text{O}$ erhitzt.
Aus der braunen Lösung, über Nacht im Kühlschrank verwahrt,
waren 1,1 g farblose Blättchen ausgefallen. Aus 250 ml Petrol-
äther (Sdp. $60^\circ - 70^\circ$) wird die Verbindung umkristallisiert;
Schmp: $141^\circ - 142^\circ$.

4,535 mg Subst.: 2,510 mg CO_2 ; 0,470 mg H_2O


4,225 mg " 0,33 ml; 24° 739 Torr



Ber: C	14,8	H	1,3	N	8,7
Gef:	15,1		1,2		8,8

Umsetzung von $(\text{NH}_4\text{NSO}_2)_4$ mit SO_2Cl_2 in siedendem CH_3CN

1 g $(\text{NH}_4\text{NSO}_2)_4$
wird mit 5 g SO_2Cl_2 in
200 ml CH_3CN zum Sieden
erhitzt. Nach 24 h wird
bei Raumtemperatur und
20 Torr abdestilliert,
der Rückstand mit
 $\text{CH}_3\text{OH}/\text{NH}_3$ versetzt und
chromatographiert (CH 7).
Sicher sind anwesend
 $(\text{H}_2\text{N})_2\text{SO}_2$ (SA)
 $(\text{NH}_4)\text{N}(\text{SO}_2\text{NH}_2)_2$ (ISA)
abgesehen von noch vor-
handenem $(\text{NH}_4\text{NSO}_2)_4$
TAS (200 - 250 mg) sowie
 NH_4SO_4 , das möglicherweise
aus SO_2Cl_2 -Resten bei der
Neutralisation entstanden
sein kann.




CH 7

Fl 1 LZ 12 Stunden

SO_2 und $(\text{NH}_4\text{NSO}_2)_4$ in siedendem CH_3CN

Im 250 ml Dreihalskolben (mit Rührer, Rückflußkühler
und Einleitungsrohr) wird 1 g feingepulvertes $(\text{NH}_4\text{NSO}_2)_4$ in
200 ml CH_3CN bei 95 - 100 ° erhitzt und dabei über konz. SO_4H_2
getrocknetes SO_2 12 h lang geleitet. Danach wurden 980 mg
eingesetztes $(\text{NH}_4\text{NSO}_2)_4$ unverändert zurückerhalten.
156,1 mg SbSt. 378,5 mg BaSO_4
66,4 mg SbSt. 6,75 ml 0.1 n NaOH
(Formoltitration)

$\text{SO}_2\text{N}_2\text{H}_4$ Ber: S 33,4; N_{NH_4} 14,6
(96) Gef: 33,4 14,4



CH 8

Gl 1 LZ 12 h

Bahn I: Umsetzungsprodukte

Bahn II: 3 μ l T 1

Cl_2 und $(\text{NH}_4\text{NSO}_2)_4$ in siedendem CH_3CN

man 1 g $(\text{NH}_4\text{NSO}_2)_4$ wurde 12 h in CH_3CN erhitzt. Dabei leitet über P_{40} getrocknetes Cl_2 in das siedende Gemisch. Danach wird das Solvens abdestilliert und der Rückstand (1,1 g) in Wasser aufgenommen. Ba^{2+} liefert eine in kalter 2 n HCl lösliche Fällung. Das Chromatogramm (CH 8) läßt nur $(\text{NH}_4\text{NSO}_2)_4$ erkennen.

Sulfamido-acet-immonium-chlorid, $\text{H}_3\text{C}-\text{C}(=\text{NH}_2^+\text{Cl}^-)\text{NH}-\text{SO}_2\text{NH}_2$

20 g (etwa 0,2 Mol) Sulfamid werden zu 150 ml kaltem CH_3CN in einen Dreihalskolben gegeben. Unter kräftigem Rühren leitet man ClH ein, der mit P_4O_{10} getrocknet war. Er löst sich glatt; die Temperatur steigt auf etwa 45° , während gelöstes Sulfamid verschwindet. Nach 30 min beginnt die Ausfällung farbloser Kristalle; sie dauert etwa 1 h. Dann beginnt die Temperatur im Innern des Gefäßes zu fallen. Man saugt ab und trocknet über Nacht (20° , 12 Torr P_4O_{10} , 12 h) Schmp: $153 - 160^\circ$ (Rohausbeute: 34 - 35 g)




Abb. 18

Zur Reinigung werden 35 g in 250 ml kaltem Methanol gelöst, mit etwa 1 l Äther gefällt und sofort abgesaugt. Nach zweimaliger Wiederholung werden 20,2 g große, farblose Kristalle erhalten. Schmp: $157 - 160^\circ$ (Zers.); Ausbeute 22,5 g (75 %).

Unlöslich in Äther, Tetrahydrofuran, CCl_4 , Methyl- und Äthylacetat, Benzol, Aceton; löslich in CH_3OH (15 - 20 proz. Lösung), $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$; in Eisessig bei Raumtemperatur schwer löslich, löst es sich in der Hitze glatt und kann unzersetzt zurückerhalten werden. Schmp: $160^\circ - 162^\circ$

4,563; 4,302 mg Sbst. 2,360; 2,218 mg CO_2 ; 1,797; 1,737 mg H_2O
8,380; 2,717 mg Sbst. liefern 1,880; 0,605 ml N_2 ; 740; 730 Torr

23; 25 °

$C_2H_8N_3SO_2Cl$ Ber: C 13,8 H: 4,6 N 24,2
 14,1; 14,1 4,4; 4,5 23,8; 24,5
 130,6; 137,1 mg Sbst. 170,5; 179,8 mg $BaSO_4$
 193,1; 186,3 mg Sbst. 10,5; 10,4 ml 0.1 n $AgNO_3$
 96,6; 39,6 mg Sbst. 5,50; 2,25 0.1 n $NaOH$
 $C_2H_8N_3SO_2Cl$ Ber: S 18,5 Cl 20,2 HCl 21,0
 Gef: 17,8; 18,0 19,3; 19,8 20,9; 21,0

Hydrolyse von Sulfamido-acet-immonium-chlorid

bei 25 ° Eine Lösung von 3,5 g (~ 20 m Mol) $H_3C-C(=NH_2^+Cl^-)$
 $NH-SO_2-NH_2$ in 20 ml H_2O von 25 ° wird nach 2 h Stehen
 bei 25 ° und 15 Torr eingedunstet. Der Rückstand wird
 mit siedendem Methylacetat (~ 57 °) extrahiert und
 der Ester abgedunstet.

Der hinterbliebene Rückstand ist Cl^- -frei, riecht
 charakteristisch nach Acetamid, schmilzt zwischen
 80 ° und 90 ° und enthält neben Acetamid, Sulfamid.

Hydrolyse- dauer in Stunden	Extraktions- gut in g	% bezogen auf freies Amidin	Mittel- wert in % an Hydrolysat
2	0,5	18	20
	0,6	22	
12	0,8	29	31
	0,9	33	
24	1,4	51	47 - 48
	1,2	44	

Mittleres MG der in wässriger Lösung befindlichen Teilchen
von Sulfamido-acet-immonium-chlorid

Die Bestimmung wurde freundlicherweise von Herrn
 Diplomchemiker Bittner im hiesigen Institut für Organische
 Chemie (Vorstand Prof. Dr. G. Hesse) durchgeführt, wofür herz-
 lich gedankt sei.

Die Messung erfolgt thermo-elektrisch mit einem Dampfdruck-Osmometer der Firma Mechrolab Inc., Californien (USA), Modell 301 A.

19,97 mg Sbst. 5 ml CHCl_3 lieferten in Wasser bei 65°
 T 555 Sktl = 0,0655 molar
 = Mol-Gew: 61

21,79 mg Sbst. 5 ml CHCl_3 lieferten in Wasser bei 65°
 T 622 Sktl. = 0,0738 molar
 = Mol-Gew: 59,1

Das mittlere MG der Zerfallsteilchen in 65° wässriger Lösung beträgt also 60. Dies entspricht hinsichtlich der Art und Anzahl der Teilchen folgender Überlegung:

Durch Hydrolyse gebildet	Molekulargewicht	Mittleres Molekulargewicht der gelösten Teilchen
1) $\text{H}_3\text{C}-\text{C}(=\text{NH})\text{NHSO}_2\text{NH}_2$	137	
H^+	1	
Cl^-	<u>35,5</u>	
	173,5 : 3 =	57,8
2) $(\text{H}_2\text{N})_2\text{SO}_2$	96	
$\text{H}_3\text{C}-\text{CO}-\text{NH}_2$	59	
H^+	1	
Cl^-	<u>35,5</u>	
	191,5 : 4 =	47,9
3) $\text{H}_3\text{C}-\text{C}(=\text{NH})\text{NHSO}_2\text{NH}_2$	137	
$\text{H}_3\text{C}-\text{CO}-\text{NH}_2$	59	
H^+	1	
Cl^-	35,5	
$(\text{H}_2\text{N})_2\text{SO}_2$	<u>96</u>	
	328,5 : 5 =	65,7

Ein Schema der Meßzelle gibt die Abb. 18a wieder, die der Betriebsanleitung "Vapor pressure Osmometer, Model 301-A" der Firma Mechrolab entnommen ist.




Abb. 18a

Messprinzip: Eine Lösung hat immer einen niedrigeren Dampfdruck als das dazugehörige reine Lösungsmittel. Die Thermistorsonde befindet sich in einer mit Lösungsmitteldampf gesättigten Kammer. Die Sonde hat zwei Thermistoren. An einem Thermistor hängt ein Tropfen Lösungsmittel, an dem anderen ein Tropfen Lösung. Da eine Dampfdruckdifferenz zwischen den beiden Tropfen besteht, gibt es an dem Tropfen der Lösung eine Kondensation. Diese Kondensation verursacht zwischen den Tropfen eine Temperaturdifferenz, die proportional der Lösungskonzentration ist.

Hydrolyse von Sulfamido-acet-immonium-chlorid bei 90 °

a) Chromatographisch:

Aus einer auf dem siedenden Wasserbad erhitzten Lösung wird jeweils nach 10 min 1 ml abpipettiert, mit 0,5 ml konz. $\text{NH}_3/\text{H}_2\text{O}$ versetzt, davon 0,02 ml auf Chromatographiepapier 2043 a (Schleicher & Schüll, Dassel, Kreis Einbeck) aufgetragen und in der üblichen Weise untersucht (CH 11). Nach 10 min liegt nur Sulfamid als Zerfallsprodukt vor (kann auch allein durch die wässrige Ammonolyse bei der Vorbereitung der Proben zur Chromatographie entstehen). Nach 30 min tritt Imido-disulfamid auf, dessen Konzentration ansteigt.

b) Präparativ:

8 g Sulfamido-acet-immoniumchlorid, gelöst in 50 ml H_2O , werden 1 h im siedenden Wasserbad auf 90 ° erhitzt. Man läßt abkühlen und neutralisiert dann mit KOH gegen Phenolphthalein und gibt noch einen kleinen Überschuß zu. Dann wird mit Methanol/Äther versetzt und die Lösung über Nacht im Kühlschrank verwahrt. 3,5 g abgeschiedene Substanz erwiesen sich chromatographisch als Gemenge von Sulfamid und Imido-disulfamid.

Man versetzt mit AgNO_3 -Lösung und filtriert das siedend heiße.



CH 11
heiße Hydrolyse von Sulfamido-acet-immonium-chlorid 90 °
Fl 1 LZ 12 h

Gemisch ab; nach dem Erkalten scheiden sich Kristalle ab, die mit Methanol/Äther gewaschen und bei Raumtemperatur getrocknet werden. Ausbeute: 0,9 g (13,6 % d. Th.) (vergl. dazu Stübinger - 7).

93,0; 64,1 mg Sbst. 2,90; 2,00 ml 0.1 SCN

212,3; 116,0 mg Sbst. 317,1 ; 188,7 mg BaSO₄

AgN(SO ₂ NH ₂) ₂ · 2 H ₂ O	Ber: Ag 34,0	S 20,1
(318)	33,7; 33,9	20,0; 20,3

c) Andere Aufarbeitung:

4 g H₃C-C(=NH₂⁺Cl⁻)NH-SO₂-NH₂ in 50 ml H₂O werden wie vorher 1 h auf 90 ° erhitzt, abgekühlt und mit KOH neutralisiert. Der beim Abdunsten des Wassers bei 25 ° (12 mm) erhaltene Rückstand wird mit methanolischer HCl 1 h auf der Maschine geschüttelt. Man filtriert ab, dunstet im Vakuum bei Raumtemperatur ein, nimmt mit 50 ml Aceton auf, filtriert und versetzt die klare Lösung mit Benzol. Über Nacht im Kühlschrank belassen, erhält man 500 mg Imidodisulfamid (13 % Ausbeute); Schmp: 158 °

73,4; 11, 3 mg Sbst. benötigen 4,01; 6,20 ml 0.1 n NaOH

Gef: 70,9; 110,8 mg HN(SO₂NH₂)₂

68,4; 75,4 mg Sbst. 183,2; 201,7 mg BaSO₄

HN(SO ₂ NH ₂) ₂	Ber: S 36,5
(175)	Gef: 36,9; 36,8

Chromatographische Untersuchung der alkali-
schen Hydrolyse von Sulfamido-acet-immonium-
chlorid

Aus der auf dem siedenden Wasserbad erhitzten Lösung von 1 g H₃C-C(=NH₂⁺Cl⁻)NH-SO₂-NH₂ in 100 ml 2 n NaOH wird jeweils nach 10 min 1 ml abpipettiert, mit 0,5 ml konz. NH₃/H₂O versetzt, davon 0,02 ml auf Chromatographiepapier

2043 a (Schleicher & Schüll) aufgetragen und in der üblichen Weise untersucht.

Nach 10 min findet man neben Sulfamid Imido-disulfamid und Amidosulfat
nach 20 - 30 min nimmt die Amidosulfatkonzentration laufend zu bis nach
40 min nur noch Amidosulfat vorliegt. Sulfamid und Imido-disulfamid sind jetzt völlig abgebaut (CH 12, 13)



CH 12
Fl 1 LZ 12 h
CH 13
Fl 1 LZ 14 h
Sulfamido-acet-immonium-chlorid in 2 n NaOH
bei 90 °

Alkalische Hydrolysen

- a) Sulfamido-acet-immoniumchlorid wird in Wasser gelöst, mit 30proz. NaOH versetzt und das in 15 min in der Siedehitze übergehende NH_3 titrimetrisch bestimmt.

134,1; 190,0 mg Sbst. 15,6; 21,8 ml 0.1 n H_2SO_4
 $\text{C}_2\text{H}_8\text{N}_3\text{SO}_2\text{Cl}$ Ber: N 16,2 (2/3 von 24,3)
 (174) Gef: 16,3; 16,1

Bei der mit heißer Lauge vollzogenen alkalischen Hydrolyse werden 2/3 des Gesamt-N frei.

- b) CH_3CONH_2 wird unter gleichen Bedingungen hydrolysiert:

73,2; 88,9 mg Sbst. 12,1; 14,8 ml 0.1 n SO_4H_2
 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ Ber: N 23,7
 (59) Gef: 23,2; 23,3

- c) CH_3CN wird ebenso behandelt:

123,5; 188,1 mg Sbst. 10,9; 17,3 ml 0.1 n H_2SO_4
 $\text{C}_2\text{H}_3\text{N}$ Ber: N 34,2
 (41) Gef: 12,4; 12,9

N-Bestimmung mit NaOBr

176,7 mg Sbst. liefern 25,7 ml N_2 (18° 732 Torr)
 94,4 mg Sbst. liefern 15,3 ml N_2 (18° 732 Torr)
 $\text{C}_2\text{H}_8\text{N}_3\text{SO}_2\text{Cl}$ Ber: N 16,2 (2/3 von 24,3)
 (174) Gef: 16,4; 16,4

Erhitzen von Sulfamido-acet-immonium-chlorid in siedendem CH_3CN

2 g $\text{H}_3\text{C}-\text{C}(=\text{NH}_2^+\text{Cl}^-)\text{NH}-\text{SO}_2\text{NH}_2$ werden 18 h in siedendem CH_3CN (Sdp. 82°) erhitzt. Chromatographisch läßt sich nach

Abdunsten des Acetonitrils außer Sulfamid keine S-N-Verbindung nachweisen. Es werden 1,9 g zurückerhalten, von anhaftenden CH_3Cn -Resten (bei 40° und 12 Torr) P_4O_{10} 12 h befreit, dann analysiert

4,764 mg Sbst.; 2,539 mg CO_2 ; 1,874 mg H_2O

39,6 mg Sbst. 2,25 ml 0.1 n NaOH

$\text{H}_3\text{C}-\text{C}(=\text{NH}_2^+\text{Cl}^-)\text{NH}-\text{SO}_2\text{NH}_2$	Ber: C 13,9	H 4,7	ClH 21,1
(174)	Gef: 14,6	4,4	20,8

Sulfamido-acet-immonium-chlorid in siedendem Pyridin (Sdp. 115°)

22 g (126 mmol) $\text{H}_3\text{C}-\text{C}(=\text{NH}_2^+\text{Cl}^-)\text{NH}-\text{SO}_2\text{NH}_2$ werden in 100 ml abs. siedendem Pyridin ($\sim 115^\circ$) 60 min unter Rückfluß erhitzt. Das ausgefallene Pyridinium-chlorid wird nach dem Erkalten abgesaugt und das Filtrat mit 50 ml CH_3OH , dann 1000 ml Äther versetzt, wobei sich ein Niederschlag bildet, der sich, kühl über Nacht aufbewahrt, vermehrt. 5,3 g Ammonium-imido-disulfamid werden in großen langen Nadeln isoliert (49,5 %)

21,3; 42,6 mg Sbst. 4,60; 8,90 ml 0.1 n H_2SO_4

77,2; 88,3 mg Sbst. 187,7; 215,3 mg BaSO_4

$(\text{H}_4\text{N})\text{N}(\text{SO}_2\text{NH}_2)_2$	Ber: N 29,2	S 33,4
(192)	29,4; 28,2	33,4; 33,8

Arbeitet man nach Ende der Umsetzung anders auf, so kann direkt das Ag-Salz $\text{AgN}(\text{SO}_2\text{NH}_2)_2$ isoliert werden.

Zur siedenden Mischung von 11 g (59 mmol) Sulfamido-acet-immonium-chlorid in 100 ml Pyridin gibt man nach einer Stunde 10 g AgNO_3 . Das Pyridin wird bei 30° / 12 Torr im Vakuum abgedunstet und der Rückstand mit ~ 50 ml heißem Wasser aufgeköcht. Es schied sich ein Ag-Salz ab, das aus heißem Wasser umkristallisiert und getrocknet wird (110° , 12 Torr P_4O_{10}) Ausbeute: 4,6 g (53 %).

163,5; 130,1 mg Sbst. 5,85; 4,55 ml 0.1 n NH_4SCN

88,5; 114,2 mg Sbst. 147,1; 191,5 mg BaSO₄
 AgN(SO₂NH₂)₂ Ber: Ag 38,3 S 22,7
 (282,1) Gef: 38,8; 38,0 22,8; 23,0

Umsetzung von Sulfamido-acet-immonium-chlorid und Pyridin bei 20 °. Darstellung von N-Amino-sulfonyl-acet-amidin

11 g H₃C-C(=NH₂⁺Cl⁻)NH-SO₂-NH₂ (640 mmol) werden in 100 ml Pyridin 30 min auf der Maschine geschüttelt. Danach hat sich alles gelöst. Mit 100 ml Äther versetzt, werden nach Trocknen im Vakuum (20 °, 12 Torr, 24 h) P₄O₁₀ 7,1 g (Ber: 7,3 g) Pyridinhydrochlorid isoliert. Aus der Lösung scheidet sich gleichzeitig ein schweres Öl ab, das jedoch mit der flüssigen Phase weiter verarbeitet wird.

Man engt im Wasserstrahlvakuum (50 °, 20 Torr) bis zur Trockenen ein. Dem Rückstand lassen sich mit Methylacetat 3,0 g (31 mmol) Sulfamid vom Schmp. 89 - 91 ° entziehen. Der vom Ester ungelöste Anteil wird in heißem Methanol (Sdp. 65 °) aufgenommen, abfiltriert und auf 1/4 (20 °, 15 - 20 Torr) eingengt. Es scheiden sich blättchenförmige Kristalle vom Schmp. 128 ° - 130 ° ab. Ausbeute: 3,0 g (~ 35 %).

5,025 mg Sbst. 3,185 mg CO₂ 1,974 mg H₂O
 23,0; 70,00 mg Sbst. 38,8; 119,3 mg BaSO₄
 2,554 mg Sbst. liefern 8,701 ml N₂ (723 Torr, 23 °)

H₃C-C(=NH)NH-SO₂NH₂ Ber: C 17,5 H 5,1 S 23,4 N 30,7
 (138) 17,3 4,4 23,2; 23,4 29,8

N-Amino-sulfonyl-acetamidin, $\text{H}_3\text{C}-\text{C}(=\text{NH})\text{NH}-\text{SO}_2-\text{NH}_2$

17,4 g (0,1 Mol) $\text{H}_3\text{C}-\text{C}(=\text{NH}_2^+\text{Cl}^-)\text{NH}-\text{SO}_2-\text{NH}_2$ werden in 100 ml kaltem abs. CH_3OH gelöst und unter Rühren mit 5,6 g (0,1 Mol) KOH in 50 ml Methanol versetzt, wobei Trübung erfolgt und KCl ausfällt. Man trennt ab und engt das Filtrat im Vakuum auf etwa 1/4 des Volumens ein. Dabei fallen farblose Kristalle. Rohausbeute 8,3 g. Aus ~ 60 ml siedendem CH_3CN (Sdp.: 82 °) umkristallisiert, erhält man Cl^- -freies, analysenreines, nicht hygroskopisches N-Amino-sulfonyl-acetamidin. Schmp.: 125 - 130 °; Zersetzung ab 120 °; Ausbeute 7,6 g (55 %). 6,376; 4,973 mg Sbst. 4,124; 3,225 mg CO_2 ; 3,001; 2,240 mg H_2O 81,5; 8,890 mg Sbst.; 137,5 ; 15,02 mg BaSO_4 62,3; 55,7 mg Sbst. 13,50; 12,15 ml 0.1 n H_2SO_4 5,108 mg Sbst. liefern 1,400 ml N_2 (740 Torr, 23 °)

$\text{H}_3\text{C}-\text{C}(=\text{NH})\text{NHSO}_2\text{NH}_2$	Ber: C 17,5	H 5,1	S 23,4
(137)	Gef: 17,7; 17,7	5,3; 5,0	23,2; 23,2
	Ber: N 30,7		
	30,4; 30,7; 30,8		

Schwer löslich in kaltem Eisessig; leicht löslich in der Hitze. Die Verbindung löst sich gut in CH_3OH , $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, Pyridin und ist unlöslich in Äther, Benzol, CHCl_3 , CCl_4 , Methylacetat. Die wässrige Lösung reagiert neutral.

Mittleres Molekulargewicht der in wässriger Lösung (65 °) vor N-Amino-sulfonyl-acetamidin befindlichen Teilchen

Auch diese Bestimmung wurde osmometrisch in dankenswerter Weise von Herrn Dipl.-Chem. Bittner durchgeführt. 13,47 mg Sbst. / 5 ml H_2O lieferten in Wasser bei 65 °
T 338 Sktl. = 0,0394 molar
= Mol Gew. 93,7

40,70 mg Sbst. / 5 ml H₂O lieferten in Wasser bei 65 °
 T 753 Sktl. = 0,0904 molar
 = Mol. Gew. 90,0

Bei der Messung wurde ein Fallen des Molekulargewichtes innerhalb kurzer Zeit bis zu den hier gefundenen Werten beobachtet.

Das mittlere MG der Zerfallsteilchen in 65 ° wässriger Lösung beträgt also 91,8. Dies entspricht hinsichtlich Art und Anzahl der Teilchen etwa der Zusammensetzung 3.

Durch Hydrolyse gebildet	Molekulargewicht	Mittleres Molekulargewicht der gelösten Teilch.
1)		
H ₃ C-C(=NH)NHSO ₂ NH ₂	137	137
2)		
(H ₂ N) ₂ SO ₂	96	
H ₃ C-CO-NH ₂	<u>59</u>	
	155 : 2 =	77,5
3)		
H ₃ C-C(=NH)NHSO ₂ NH ₂	137	
(H ₂ N) ₂ SO ₂	96	
H ₃ C-CO-NH ₂	<u>59</u>	
	292 : 3 =	97,3

Alkalische Hydrolyse von N-Amino-sulfonyl-acetamidin

Die Substanz wird in H₂O gelöst, mit 30 % NaOH versetzt und das in 15 min in der Siedehitze übergehende NH₃ in

überschüssiger 0.1 n H_2SO_4 aufgefangen.

67,0; 35,0 mg Subst. 9,60; 5,20 ml 0.1n H_2SO_4

$\text{H}_3\text{C}-\text{C}(=\text{NH})\text{NH}-\text{SO}_2-\text{NH}_2$ Ber: N 20,4 (2,3 von 30,7)
(137) 20,1; 20,6

Bei der alkalischen Hydrolyse werden 2/3 des Gesamtstickstoffes als NH_3 frei.

Thermisches Verhalten von Sulfamido-acet-immonium-chlorid

Etwa 10 m Mol $\text{H}_3\text{C}-\text{C}(=\text{NH}_2^+\text{Cl}^-)\text{NH}-\text{SO}_2-\text{NH}_2$ werden im Porzellantiegel 2 h im Trockenschrank bei bestimmter Temperatur erhitzt, im Exsikkator über P_4O_{10} abgekühlt, gewogen und der Schmp. bestimmt. Die Ergebnisse gibt die folgende Tabelle wieder:

Temp. in °C	Einwaage in g	Auswaage in g	Gewichts- differenz in g	Gewichts- differenz in %	Schmp. in °C
100 °	1,2898	1,2905	+ 0,7		157 - 160
	1,2703	1,2702	- 0,1		
110	1,2905	1,2900	- 0,5		157 - 160
	1,2702	1,2701	- 0,1		
120	1,6904	1,6704	- 20,0	1,2	
	1,7400	1,7166	- 23,4	1,4	

Nach etwa 1,5 h sintert die Substanz und man erhält eine zähe, farblose Masse, die bei der Schmp.-Untersuchung zunehmend schmilzt, bei 160 ° weitgehend verflüssigt ist und sich von nun ab über gelb orange (165 °) nach braun (170 °) verfärbt.

Eine Anzahl von Reagensgläsern, die 0,5 g Substanz enthalten, werden im Ölbad stufenweise erhitzt (~ 5 min); die Temperatur mit Kontakt-thermometer und Relais eingestellt.

Bei der jeweiligen Temperatur wird eine Probe ent-

nommen, mit 1 ml $\text{NH}_3/\text{H}_2\text{O}$ nach dem Abkühlen versetzt und chromatographiert. Es ergibt sich folgendes Bild (CH 12 und CH 13): Bei


- 95 ° - 130 ° unverändert, noch keine Zersetzungsprodukte;
 145 ° eine Vielzahl von Verbindungen tritt auf, z. B. Imido-disulfamid, Amidosulfat, Trisulfimid, Sulfat;
 150 ° Imido-disulfamid-menge steigt;
 160 ° - 180 ° die Zahl der Zerfallsprodukte nimmt zu bis
 185 °, dann ist sie wieder rückläufig.



CH 12

Fl 1; LZ 12h

Thermisches Verhalten von Sulfamido-acet-immonium-chlorid



CH 13

Fl 1; LZ 14h

Thermisches Verhalten von Sulfamido-acet-immonium-chlorid

Thermisches Verhalten von N-Amino-sulfonyl-acetamidin

Etwa 10 mmol $\text{H}_3\text{C}-\text{C}(=\text{NH})\text{NH}-\text{SO}_2-\text{NH}_2$ werden in einem Porzellanschälchen 2 h im Trockenschrank bei bestimmter Temperatur erhitzt, im Exsikkator über P_4O_{10} abgekühlt, gewogen und der Schmp. bestimmt. Die Ergebnisse gibt die Tabelle wieder.

Temp. in °C	Einwaage in g	Auswaage in g	Gewichts- differenz in g	Gewichts- differenz in %	Schmp. in °C
90	1,2800	1,2793	- 0,7		125-130
	1,3572	1,3571	+ 0,1		
100	1,2793	1,2793	0,0		125-130
	1,3571	1,3570	- 0,1		
110	1,2793	1,2793	0,0		125-130
	1,3570	1,3570	0,0		
120	1,2793	1,2775	1,8	0,15	Die leicht zusammengesinterte Sub- stanz schmilzt von 90 ° aufwärts bis 125 °
	1,3570	1,3565	2,5	0,18	
130	1,2775	1,2023	75,2	6,3	
	1,3565	1,2762	80,3	6,3	

Umsetzung von N-Amino-sulfonyl-acetamidin mit SO_2Cl_2

6,7 g Amidin (~ 50 mmol) werden mit 6,7 g SO_2Cl_2 (~ 50 mmol) in 100 ml siedendem Acetonitril (82°) erhitzt. Nach 18 h Sieden dunstet man das überschüssige CH_3CN ab und untersucht den Rückstand chromatographisch. Hauptsächlich lag neben vielen anderen Verbindungen Sulfamid-mono-sulfonat vor $\text{H}_2\text{N}-\text{SO}_2-\text{NH}-\text{SO}_2-\text{NH}_2$.

Die nach dem Abdunsten hinterbleibende zähe Masse wird unter Eis-Kochsalzkühlung langsam mit 50 ml konz. NH_3 Wasser versetzt. Zur erzielten Lösung gibt man 100 ml Äthanol. Es entstehen zwei flüssige Phasen. Die schwerere wird abgetrennt und nach Reichelt (51) langsam mit Methanol versetzt. Die Fällung wird getrocknet (21° , 12 Torr, P_4O_{10} , 24 h). Ausbeute 5,2 g ($\sim 50\%$) $\text{H}_2\text{N}-\text{SO}_2\text{NNH}_4-\text{SO}_3\text{NH}_4$

57,6; 94,2 mg Sbst.	127,3; 211,3 mg BaSO_4
89,9; 126,2 mg Sbst.	17,4; 19,3 ml 0.1 n H_2SO_4
$\text{H}_2\text{N}-\text{SO}_2-\text{N}(\text{NH}_4)-\text{SO}_3\text{NH}_4$	Ber: S 30,0 N 26,6
(210)	Gef: 30,1; 30,4 27,0; 27,0

Sulfamid mit CH_3CN und HCl in Gegenwart von

a) Methylacetat

In eine kalte Lösung von 4,3 g Sulfamid (50 m Mol) und 2,1 g CH_3CN (50 m Mol) in 100 ml Methylacetat $\text{CH}_3\text{COOCH}_3$ wird 3 h getrockneter HCl eingeleitet. Schwache Ausfällung erfolgt erst nach Zusatz von 0,5 l Äther. Über Nacht findet bei -20° stärkere Kristallabscheidung statt. Ausbeute: 4,2 g Sulfamid vom Schmp: $90^\circ - 92^\circ$

52,9; 54,1 mg Sbst.	128,1; 130,4 mg BaSO_4
$(\text{H}_2\text{N})_2\text{SO}_2$	Ber: S 33,4
(96)	Gef: 33,1; 33,0

b) Dimethylformamid

10 g Sulfamid (100 m Mol) lösen sich in 50 ml kaltem Dimethylformamid, $\text{HCON}(\text{CH}_3)_2$ und werden mit 10 g CH_3CN (250 m Mol) versetzt und 2 h getrockneter ClH eingeleitet. Auch nach 24 h Stehen trat keine Ausfällung ein. Das Lösungsmittel wurde im Vakuum abgedunstet; unverändertes Sulfamid hinterblieb, das aus Methylacetat umkristallisiert wurde. Ausbeute: 8,5 g, Schmp: $89^\circ - 90^\circ$

Zur Reinigung werden 5 g in 20 ml Methanol gelöst und mit 400 ml Äther unter kräftigem Rühren gefällt. Ausbeute:

3,8 g (17 %), Schmp: 155 °

4,899 mg Sbst. 2,070 mg CO₂; 1,733 mg H₂O

56,4; 132,0 mg Sbst. 8,7; 144,3 mg BaSO₄

173,2; 70,0 mg Sbst. 8,0; 3,2 ml 0.1 n AgNO₃

65,9; 160,2 mg Sbst. 3,05; 7,3 ml 0.1 n NaOH

C₂H₈N₃SO₂Br Ber: C 11,1 H 3,7 S 14,7 Br 36,7

(218) Gef: 11,5 3,9 14,8 36,9

14,4 36,5

Sulfamido-acet-immonium-p-toluol-sulfonat, H₃C-C(=NH₂⁺O₃S-
-C₆H₄-CH₃)NH-SO₂-NH₂

8,7 g (50 m Mol) H₃C-C(=NH₂⁺Cl⁻)NH-SO₂-NH₂ werden in 50 ml kaltem abs. CH₃OH gelöst und mit einer Lösung von 19,0 g (~ 100 m Mol) in 100 ml CH₃OH vereinigt. Die klare Gesamtlösung wird im Vakuum (30 °, 15 - 20 Torr) zur Trockene eingedunstet. Den festen Rückstand trocknet man im Vakuum (20 °; 15 mm; 2 h); dann überführt man mit Methanol/Äther (1 : 4) auf einer Fritte. Ausbeute 4,9 g (~ 32 %), Schmp: 168 - 160 °. Farblose, kristalline Substanz, die mit Ag⁺ keine Fällung gibt; löslich in CH₃OH, C₂H₅OH; unlöslich in Äther. Die wässrige Lösung reagiert stark sauer.

96,0; 87,2 mg Sbst. 146,5; 133,7 mg BaSO₄

6,680; 4,24 " " 8,432; 5,27 mg CO₂; 2,82; 1,946 mg H₂O


4,715 mg Sbst. liefern 0,625 ml N₂ (736 Torr, 26 °)

6,473 mg " " 0,815 ml N₂ (795 Torr, 23 °)

C₉H₁₅N₃O₅S₂ Ber: C 34,9 H 4,9 N 13,6 S 20,7

(309) Gef: 34,5; 35,6 4,7; 5,1 14,1; 13,6 21,0; 21,1

Sulfamido-acet-immonium- -naphthyl-sulfonat,



Aus 10,4 g (50 m Mol) Naphthalin-sulfonsäure, C₁₀H₈SO₃H, und 8,7 g (0,05 Mol) Sulfamido-acet-immonium-chlorid wurden 2,5 g Sulfamido-acet-immonium- -naphthyl-sulfonat, H₃C-C(=NH₂⁺O₃S-C₁₀H₈)NH-SO₂-NH₂ (~ 17 %) erhalten. Farblose Kristalle, deren wässrige Lösung mit Ag⁺ keine Fällung gibt und stark sauer

reagiert. Schmp: 174 ° - 175 °

116,8; 82,5 mg Sbst. 161,9; 114,1 mg BaSO₄
 3,866 mg Sbst. 5,854 mg CO₂; 1,512 mg H₂O
 2.732 mg Sbst. liefern 0,325 ml N₂ (23 °, 733 Torr)

C ₁₂ H ₁₆ N ₄ O ₅ S ₂	Ber: C 41,8	H 4,4	N 12,2	S 18,7
(346)	Gef: 42,3	4,4	13,0	19,0; 19,0

Sulfamido-prop-immonium-chlorid, H₃C-CH₂-C(=NH₂⁺Cl⁻)NH-SO₂-NH₂

4,5 g Sulfamid (50 m Mol) werden in 125 ml Propionitril, CH₃CH₂CN, unter Rühren mit getrocknetem ClH umgesetzt. 40 min nach Beginn der ClH-Zufuhr trat starke kristalline Fällung ein. Nach 2 h filtriert man ab und löst in 50 ml CH₃OH; daraus kann das Immonium-chlorid mit etwa 200 ml Äther als schwach gelbliches Öl abgeschieden werden. In der Tiefkühltruhe bei -20 ° erstarrt es zu stäbchenförmigen, farblosen Kristallen. Ausbeute 3,6 g (41 %), Schmp: 160 ° - 162 °.

4,510 mg Sbst. 3,126 mg CO₂; 2,160 mg H₂O
 84,3; 52,6 mg Sbst. 105,7; 67,0 mg BaSO₄
 60,8; 105,2 mg Sbst. benötigen 3,25; 5,50 ml NaOH

C ₃ H ₁₀ N ₃ SO ₂ Cl	Ber: C 19,3	H 5,3	S 17,4	HCl 19,6
(188)	18,9	5,4	17,3	19,5
			17,4	19,5

Sulfamido-carbo-methoxy-acet-immonium-chlorid

H₃C-O-CO-CH₂-C(=NH₂⁺Cl⁻)NH-SO₂-NH₂


7 g (74 m Mol) Sulfamid werden in 100 ml Cyanessigsäure-methyl-ester, NC-CH₂CO⁻OCH₃, gelöst und unter Rühren getrockneter ClH eingeleitet. Nach 2 h beginnt die Ausfällung

farbloser, kristalliner Substanz. Nach weiteren 30 min wird die Reaktion beendet. Man löst die Fällung in 100 ml Äthanol, filtriert ab und versetzt mit 300 ml Äther bis zur Trübung. Danach läßt man in der Kühltruhe bei -20° über Nacht kristallisieren; es scheiden sich weiße, blättchenförmige Kristalle ab. Ausbeute: 7,0 g (45 %), Schmp: $120^{\circ} - 125^{\circ}$

4,585; 4,390 mg Sbst. 3,510; 3,380 mg CO_2 ; 1,800; 1,740 mg H_2O
 3,007 mg Sbst. liefern 0,506 ml N_2 (28° , 726 Torr)
 3,168 mg Sbst. liefern 0,526 ml N_2 (27° , 727 Torr)
 25,0; 40,0 mg Sbst. 53,2; 86,1 mg BaSO_4
 9,878; 10,384 mg Sbst. 9,930; 10,320 mg BaSO_4
 9,878; 10,384 mg Sbst. 9,930; 10,320 mg BaSO_4

$\text{C}_4\text{H}_{10}\text{SO}_4\text{N}_3\text{Cl}$	Ber: C 20,7	H 4,0	N 18,1	S 13,8
(321)	Gef: 20,9	4,4	18,2	13,7; 13,8
	21,0	4,4	18,1	13,8; 13,6

Sulfamido-carbo-äthoxy-acet-immonium-chlorid



130 g Cyanessigsäure-äthyl-ester, $\text{NC}-\text{CH}_2-\text{CO}-\text{OC}_2\text{H}_5$, und 10 g (10 % m Mol) Sulfamid werden unter Erwärmen auf dem Wasserbad mit getrocknetem ClH umgesetzt. Nach etwa 45 min beginnt die Ausfällung farbloser Kristalle. Jetzt wird die Wärmezufuhr abgebrochen und noch ca. 15 min ClH eingeleitet. Dann läßt man einige Stunden bei Raumtemperatur stehen und saugt ab. Das erhaltene Rohprodukt wird in 50 ml Methanol gelöst, mit 1,5 l Äther versetzt und in der Kühltruhe über Nacht verwahrt. Ausbeute: 13,5 g (25 %), Schmp: 124°

4,265; 4,602 mg Sbst. 3,803; 4,085 mg CO_2 ; 1,869; 1,990 mg H_2O
 156,3 mg Sbst. 147,3 mg BaSO_4
 103,8; 86,5 mg Sbst. 4,20; 3,50 ml 0.1 n AgNO_3
 112,3 mg Sbst. 4,70 ml 0.1 n NaOH

$C_5H_{12}N_3O_4SCl$ (246)	Ber: C 24,5	H 4,9	S 13,1	Cl 14,5
	Gef: 24,3; 24,2	4,9; 4,8	12,9	14,4
				14,5
	Ber: HCl 14,9			
	15,3			

Substituierte Sulfamide mit CH_3CN und HCl

6,2 g (50 m Mol) asym. Dimethylsulfamid, $(CH_3)_2N-SO_2-NH_2$, werden in 200 ml CH_3CN mit trockenem ClH unter Rühren umgesetzt. Nach 50 min ist eine klare Lösung entstanden, die sich von selbst zum Sieden erhitzt. Nach 2 h tritt Ausfällung ein; 20 g Rohprodukt werden erhalten. Schmp: $128^\circ - 130^\circ$. In 200 ml Äthanol gelöst und mit 250 ml Äther gefällt, kristallisieren beim Stehen lange Nadeln vom Schmp. 130° aus. Ausbeute 4,2 g. Die S-freie Substanz enthält C, H, N, Cl und reagiert stark sauer.

Auch bei der Umsetzung von 10 g (75 m Mol) sym. Dibutylsulfamid $(C_4H_9NH)_2SO_2$ mit HCl in 100 ml CH_3CN bildet sich nach tagelangem Stehen das Acetamid-hydrochlorid in einer Ausbeute von 3,7 g.

4,604 mg Sbst. 4,277 mg CO_2 ; 2,607 mg H_2O

4,678 mg Sbst. liefern 0,618 ml N_2 (23° , 740 Torr)

148,0 mg Sbst. 12,50 ml 0.1 n NaOH

$(CH_3CONH_2) - HCl$ (95,5)	Ber: C 25,2	H 6,3	N 14,2	HCl 38,2
	Gef: 25,2	6,3	14,8	38,7

Aus der Lösung von 7,1 g (50 m Mol) Monobutylsulfamid, $C_4H_9NH-SO_2NH_2$, konnte beim Versetzen mit Äther keine Ausfällung erzielt werden. Dunstet man das Solvens ab, so hinterbleibt zunächst eine halbfeste, farblose Masse, die beim Anreiben mit etwas Benzol/Wasser langsam kristallisierte. Die Ausgangsverbindung wurde zurückerhalten. Schmp: $45^\circ - 50^\circ$

Umsetzung von Imido-disulfamid mit CH_3CN und HCl

17 g $\text{HN}(\text{SO}_2\text{NH}_2)_2$ (etwa 0,1 Mol) werden in 100 ml CH_3CN unter Rühren mit getrocknetem ClH umgesetzt. Die Lösung erwärmt sich dabei auf etwa 40° . Nach etwa 2 h geht die Temperatur zurück und 11,5 g Rohprodukt können abgesaugt werden. In 100 ml Äthanol gelöst und mit 500 ml Äther gefällt, werden Kristalle vom Schmp. $156^\circ - 158^\circ$ (20° , 12 Torr; 24 h; H_2SO_4) erhalten. Es liegt Sulfamido-acet-immonium-chlorid vor. Ausbeute 2,3 g (6,8 %).

157,2; 98,3 mg Sbst. 9,20; 5,85 ml 0.1 n NaOH

142,5; 148,3 mg Sbst. 8,35; 8,55 ml 0.1 n AgNO_3

47,7; 51,0 mg Sbst. 66,2; 75,4 mg BaSO_4

$\text{C}_2\text{H}_8\text{N}_3\text{SO}_2\text{Cl}$	Ber: S 18,5	Cl 20,1	ClH 21,1
(174)	Gef: 19,0; 18,7	20,8; 20,5	21,3; 21,7

Umsetzung von Harnstoff mit Acetonitril und Chlorwasserstoff

a) 40 g ($2/3$ Mol) Harnstoff werden in 200 ml absol. CH_3CN in einem Dreihalskolben mit getrocknetem ClH umgesetzt. Nach etwa 10 min ist der Harnstoff in ein schweres Öl umgewandelt, das sich nach Abstellen der Rührung unter dem CH_3CN abscheidet. Man leitet noch weitere 30 min ClH ein. Dann wird die Apparatur (Abb. 12) gedreht und das Öl unter Feuchtigkeitsausschluß von geringen, noch nicht umgesetzten Harnstoffresten abgetrennt und dabei durch eine auf den Kolben aufgesetzte Doppelwegfritte in einen damit verbundenen Scheidetrichter gesaugt. Dort kann die Trennung von CH_3CN durchgeführt werden. Das schwere Öl wird nun in einen ebenfalls bereits mit dem Scheidetrichter verbundenen Kolben überführt. Nach einigen Stunden kristallisiert bei -20° (Tiefkühltruhe) das Öl in langen Nadeln und kann von geringen Mengen Acetonitril durch

Absaugen und dann durch Vakuumbehandlung befreit werden. Ausbeute 41 g (~ 43 %) an Harnstoff-hydrochlorid. Die grobkristalline Substanz ist sehr hygroskopisch.




Abb. 12

266,0; 262,5 mg Sbst. 34,55; 53,40 ml 0.1 n H_2SO_4
 5,924 mg Sbst. 2,782 mg CO_2 ; 2,895 mg H_2O
 105,9; 104,5 mg Sbst. 10,70; 10,50 ml 0.1 n NaOH
 214,3; 304,5 mg Sbst. 21,0; 30,7 ml 0.1 n $AgNO_3$

$(H_2N)_2CO \cdot HCl$	Ber: N 29,0	C 12,5	H 5,2	HCl 37,8	Cl
(96,5)	Gef: 28,7;	12,8	5,5	36,2	34,7
	28,5			36,8	35,7

- b) Unterbricht man die Umsetzung von $(H_2N)_2CO$ mit HCl in CH_3CN unmittelbar nach der Abscheidung des schweren Öles (nach 10 - 15 min) und arbeitet wie beschrieben auf, so erhält man über Nacht bei -20° eine harte Kristallmasse.

Ausbeute: 42 g (81 %) an Diharnstoff-hydrochlorid (20 °;
0,1 Torr; P_{40}^{10} ; 24 h) Schmp: 55 - 60 °

194,0; 189,7 mg Sbst. 45,10; 43,75 ml 0.1 n H_2SO_4
4,615 mg Sbst. 2,614 mg CO_2 ; 2,147 mg H_2O
164,6 mg Sbst. 17,15 ml 0.1 n $AgNO_3$

$2(H_2N)_2CO \cdot HCl$	Ber: N 35,9	C 15,3	H 5,8	Cl 22,7
(157)	Gef: 32,4; 32,4	15,5	5,1	23,1

Umsetzung von Thioharnstoff mit CH_3CN und ClH

Man löst 40 g (0,5 Mol) Thioharnstoff in 200 ml CH_3CN und leitet eine Stunde ClH in die Lösung ein. Unter Erwärmen wird die Lösung nach etwa 10 - 15 min zu einem dicken Brei. Man nimmt in Methanol auf und scheidet mit Äther ein Öl ab, das beim Kühlen mit Aceton/Trockeneis erstarrt. Ausbeute: 5,4 g (91 %); Schmp: 95 ° - 98 °; löslich in Alkoholen, Dimethylformamid, Dimethylsulfoxid und Pyridin (in Hitze).

4,662 mg Sbst.; 1,859 mg CO_2 ; 1,927 mg H_2O
2,095; 2,706 mg Sbst. 0,480; 0,626 ml N_2 (28 °, 729 Torr)
110,5; 160,5 mg Sbst. 10,02; 14,80 ml 0.1 n $NaOH$

$(H_2N)_2CS \cdot HCl$	Ber: C 10,6	N 24,9	H 4,5	ClH 32,5
(122,5)	Gef: 10,9	24,9; 25,2	4,6	32,4
				32,6

Umsetzung von Urethan mit CH_3CN und HCl

89 g Urethan ($\sim$ 1 Mol) lösen sich in CH_3CN unter Abkühlen. Man leitet unter Rühren etwa 30 min ClH ein. Nach etwa 5 min beginnt sich die Lösung zu erwärmen, nach weiteren 5 min färbt sie sich gelblich. Über Nacht entstehen 60 g


große, farblose Kristalle - Schmp: 175° - 178° - aus, die abgetrennt werden und aus 350 ml Methanol mit 250 ml Äther unter langsamen Zutropfen gefällt werden. Ausbeute 33,5 g (20 %), Schmp: 180° - 181° (unter kräftiger Gasentwicklung und Gelbfärbung).

4,874; 4,815 mg Sbst. 6,523; 6,360 mg CO_2 ; 2,576; 2,300 mg H_2O
 108,6; 132,0 mg Sbst. 13,00; 13,35 ml 0.1 n H_2SO_4
 179,6; 151,5 mg Sbst. 10,65; 8,90 ml 0.1 n AgNO_3

$\text{C}_5\text{H}_{11}\text{N}_2\text{O}_2\text{Cl}$	Ber: C 36,0	H 6,6	N 16,9	Cl 21,3
(167)	36,5; 36,0	5,9; 6,5	16,8; 17,3	21,1
				20,8

Die Verbindung reagiert in wässriger Lösung praktisch neutral.


Methyl-mercapto-N-amino-sulfonyl-form-amidinium-chlorid,



4,8 g (50 m Mol) Sulfamid werden in 100 g Methyl-rhodanid schwach erwärmt und mit P_{40}^{10} getrockneter ClH eingeleitet. Nach etwa 45 min trennt man vom ungelösten Sulfamid in der Schutzgasfritte (Abb. 13) ab und überführt in das Schlenkrohr II. Im Verlauf von 2 Tagen schieden sich bei Raumtemperatur aus der Lösung reichlich farblose Kristalle ab. Die Lösung wird durch die Schutzgasfritte wieder in das Schlenkrohr I überführt und von dort im Vakuum abgedunstet. Der Kristallrückstand wird dreimal mit je 20 ml absol. Äther gewaschen und getrocknet (20° , 1 Torr, 24 h). Farblose, übelriechende Kristalle, die gegen Luftfeuchtigkeit empfindlich sind und sich bei längerem Stehen zersetzen.

13,972 mg Sbst. 5,821 mg CO₂; 5,405 mg H₂O
 5,860 mg Sbst. liefern 1,396 ml N₂ (23 °, 744 mm)
 45,3; 19,1 mg Sbst. 109,6; 45,7 mg BaSO₄

C₂H₈S₂N₃O₂Cl Ber: C 11,8 H 3,9 S 31,2 N 20,4
 (206) 11,4 4,3 30,9; 30,2 18,3



Versuchsanordnung zur Darstellung von $\text{CH}_3\text{-S-C} \begin{matrix} \text{= NH}_2^+ \text{Cl}^- \\ \text{NH-SO}_2\text{-NH}_2 \end{matrix}$


Abb. 13

Reaktion von SO_2Cl_2 mit $(\text{H}_2\text{N})_2\text{SO}_2$ (Molverhältnis 2 : 1)

18,4 g $(\text{H}_2\text{N})_2\text{SO}_2$ (200 m Mol) werden in 200 ml siedendem Acetonitril ($\sim 82^\circ$) mit 54 g (400 mMol) SO_2Cl_2 umgesetzt, das innerhalb von 2 h langsam zugetropft wird. Nach insgesamt 18 h arbeitet man in früher beschriebener Weise (44) auf Ammonium-tera-sulfimid auf. Ausbeute 0,5 g $(\text{NH}_4\text{NSO}_2)_4$; 1,5 % bezogen auf Sulfamid.

Schütteln von Sulfamid mit SO_2Cl_2 bei Raumtemperatur in CH_3CN (1:1)

9,6 g (0,1 Mol) Sulfamid wurden mit 13,5 g (0,1 Mol) SO_2Cl_2 in 100 ml CH_3CN 19 h auf der Maschine geschüttelt. Nach dem Abdunsten des Solvens (20° , 12 Torr) blieb der Kolben noch 24 h an der Wasserstrahlpumpe mit zwischengeschalteten Trockenrohren. Dadurch sollen SO_2Cl_2 -Reste und CH_3CN weitgehend entfernt werden. 9,7 g trockener Substanz blieben zurück. Am Chromatogramm erkennt man viel Sulfamid und wenig Sulfat. Es dürfte von SO_2Cl_2 -Resten herrühren, da eine schwache AgCl -Fällung erhalten wurde.



CH 14

Sulfamid und SO_2Cl_2 bei Raumtemperatur in CH_3CN

Fl 1 LZ 13 h

Bahn I: Rückstand

Bahn II: 3 μ 1 T 1

Sulfamid und SO_2Cl_2 (Molverh. 1 : 1) in siedendem CH_3CN

$(\text{NH}_4\text{NSO}_2)_4$ wurde wie folgt nach der Vorschrift von Bencker, Leiderer und Meuwesen dargestellt:

3,8 g (40 mmol) reines $(\text{H}_2\text{N})_2\text{SO}_2$ werden in 25 ml reinem CH_3CN mit 5,4 g (40 mmol) frisch destilliertem SO_2Cl_2 unter Rückflußkühlung auf dem Wasserbad erhitzt. Um Überhitzen und Siedverzug zu vermeiden, wurden Siedkapillaren aus Glas verwendet. Nach 18 h Sieden wurde bei $25^\circ - 30^\circ$ und 20 Torr das Lösungsmittel unter Feuchtigkeitsausschluß entfernt. Der Rückstand wird mit Eiswasser gekühlt und eine eiskalte Mischung aus 10 ml konz. $\text{NH}_3/\text{H}_2\text{O}$ und 20 ml Wasser zugeführt. Durch Erwärmen auf dem Wasserbad wird unter weiterem Zusatz von Wasser eben gelöst; man filtriert und läßt langsam, zuletzt in Eiswasser, abkühlen. Die ausgeschiedenen Kristalle werden mehrmals mit wenig eiskaltem Wasser gewaschen, endlich über P_4O_{10} oder SO_4H_2 im Vakuum getrocknet. Die Ausbeute wechselt und beträgt durchschnittlich 30 %.

133,1; 104,5 mg Sbst. 321,4; 256,7 mg BaSO_4
 176,0 mg Sbst. 18,7 ml 0.1 n SO_4H_2

$(\text{NH}_4\text{NSO}_2)$	Ber: S 33,4	N NH_4	14,6
(96)	Gef: 33,1; 33,8		14,9

Die nach dem Einebnen verbliebene Mutterlauge der Umsetzungsprodukte wurde chromatographisch untersucht. Es finden sich Sulfamid, Imido-disulfamid, Amidosulfat, Sulfamid-monosulfonat, Sulfamid-disulfonat, Sulfat, NH_4 Trisulfimid und NH_4 Tetrasulfimid (CH 15). Das nach diesen Umsetzungen abdestillierte CH_3CN enthält noch SO_2Cl_2 .


CH 15

Mutterlauge der Umsetzung
Sulfamid/ SO_2Cl_2 (1 : 1)
nach Einengen

Fl 1 LZ 12 h

Bahn I: Reaktionsgut

Bahn II: 3 μ l T 1




Sulfamid und zutropfendes SO_2Cl_2 in siedendem CH_3CN
(Molverhältnis 1 : 1)

22,4 g (~ 240 mmol) $(\text{H}_2\text{N})_2\text{SO}_2$ werden in 250 ml CH_3CN gelöst und am Rückflußkühler auf $95^\circ - 100^\circ$ erhitzt. Trockenrohre mit P_4O_{10} auf Glaswolle verhindern den Zutritt von Feuchtigkeit. Nach etwa 30 min siedet das Gemisch; Sulfamid hat sich gelöst. Jetzt läßt man über eine Kolonne eine Lösung von 10 g SO_2Cl_2 in 50 ml CH_3CN (Lösung I) langsam innerhalb von 2 1/2 h zutropfen. Die Kolonne verteilt das zutropfende SO_2Cl_2 weitgehend gleichmäßig im CH_3CN und führt es auch an der Eintropfstelle sehr verdünnt dem Reaktionsgemisch zu. Nach 45 min tritt die erste Fällung auf, die mit der Zeit zunimmt. Nachdem die Lösung I zugetropft ist, wird eine zweite Lösung von 22,4 g SO_2Cl_2 in 50 ml CH_3CN ebenfalls tropfenweise in 2 h dem Reaktionsgemisch zugegeben. Nach insgesamt 24 h Sieden arbeitet man auf $(\text{NH}_4\text{NSO}_2)_4$. Das abdestillierte


CH_3CN enthält noch SO_2Cl_2 . Ausbeute 13,5 g (30 %) $(\text{NH}_4\text{NSO}_2)_4$.

Das Filtrat wurde nach Abtrennung von $(\text{NH}_4\text{NSO}_2)_4$ in drei verschiedenen Konzentrationen untersucht (CH 16, CH 17)



CH 16

Fl 1 LZ 12 h
Bahn I: 1 μ l Filtrat
" II: 3 μ l T 1



CH 17

Fl 1 LZ 12 h
Bahn I: 2 μ l Filtrat
" II: 3 μ l "
" III: 3 μ l T 1

Aus dem Grad der Schwärzung der Flecken läßt sich entnehmen, daß Trisulfimid und Sulfat in größeren Konzentrationen vorliegen, gefolgt von Sulfamid-disulfonat und wenig Sulfamid-monosulfonat, Amidosulfat sowie Imidodisulfamid. Sulfamid erscheint erst nach Auftragen großer Konzentrationen auf dem

Chromatogramm. Es kann daher gefolgert werden, daß das eingesetzte Sulfamid praktisch völlig aufgebraucht wurde.

Umsetzung von $(\text{NH}_2)_2\text{SO}_2$ mit zutropfendem SO_2Cl_2 (Molverhältnis 3 : 1) in siedendem CH_3CN

48 g $\text{SO}_2(\text{NH}_2)_2$ (500 mmol) werden unter Rühren in 100 ml CH_3CN in einem 1 l-Dreihalskolben unter Feuchtigkeitsausschluß bei $95^\circ - 100^\circ$

gelöst. Ist dies nach etwa

45 min geschehen, so läßt

man über eine Kolonne (Abb. 10)

im Laufe von 2 h eine Lösung

von 21,6 (160 mmol) Cl_2SO_2 in

100 ml CH_3CN in den Reaktions-

kolben tropfen. Dabei beginnt

sich Substanz aus der schwach

gelben Lösung auszuscheiden.

Die Fällung ballt sich zu einer

zähen Masse zusammen, das Rüh-

ren wird eingestellt. Nach 24 h

ist die Umsetzung beendet.

CH_3CN wird ($20^\circ - 30^\circ$, 10 -

15 Torr) abdestilliert und wieder kondensiert. Den staubtrockenen

Rückstand (55 - 60 g) schüttelt man mit etwa 200 ml $\text{NH}_3/\text{CH}_3\text{OH}$

(etwa 20 molar). Nach dem Abdestillieren von $\text{NH}_3/\text{CH}_3\text{OH}$ löst

man den Rückstand in der eben ausreichenden Menge von heißem

$\text{NH}_3/\text{H}_2\text{O}$, filtriert heiß und läßt über Nacht im Kühlschrank kri-

stallisieren. Zweimal mit eiskaltem Wasser gewaschen, wird das

Präparat getrocknet.

Ausbeute: 28 g (91 % bezogen auf Cl_2SO_2 oder 30 % bezogen auf

Sulfamid.





Abb. 10

2,839 mg Subst. liefern 0,773 ml N_2
(26 °C; 748 Torr)

115,9 mg; 12,0 ml 0.1 n HCl

$N_2H_4SO_2$ Ber: N 29,2 N_{NH_4} 14,6
(96) Gef: 28,8 14,5

Die nach dem Einengen verbliebene Mutterlauge wurde chromatographisch untersucht (CH 18). Es finden sich: Sulfamid, Imido-disulfamid, Amidosulfat, Sulfamid-monosulfonat, Sulfamid-disulfonat, Sulfat, NH_4 Trisulfimid und NH_4 -Tetrasulfimid.




CH 18

Fl 1 LZ 12 h

Bahn I: 3 μ l Mutterlauge

Bahn II: 3 μ l T 1

Der zeitliche Ablauf dieser Reaktion wurde chromatographisch verfolgt. Zu bestimmten Zeiten entnehmen wir jeweils 0,2 ml Reaktionsgemisch einschließlich vorhandener Festsubstanz, lösen in 2 ml 2 n NH_3/H_2O und tragen davon jeweils 2 μ l auf Papier 2043 a (Schleicher & Schüll, Dassel/Einbeck) auf. LZ 14 h, Fl 1 (Abb. 32 : 30 - 220 min; Abb. 33 : 235 - 460 min).



CH 19

Reaktionsablauf $(H_2N)_2SO_2$ mit Cl_2SO_2 (3 : 1) in heißem CH_3CN 30 - 220 min. Die jeweilige Entnahmekzeit ist an der Abszisse abzulesen.

Fl 1

LZ 12 h

Nach	30	min	ist Sulfamid in siedendem CH_3CN gelöst
"	40	min	beginnt Cl_2SO_2 zuzutropfen
"	60 - 70	min	ist neben Sulfamid wenig Sulfat nachweisbar, das vom Cl_2SO_2 herrührt
"	100	min	tritt Sulfamid-Monosulfonat auf (das in der Lösung wohl als Sulfohalogenid vorliegt)
"	115	min	also fast 2 h, sind auch Imidodisulfamid, Amidosulfat und Sulfamid Disulfonat in etwa gleicher Menge zu erkennen
"	130	min	ist Amidosulfat wieder verschwunden
"	145	min	entstehen Tetrasulfimid und Polysulfimid $(\text{O}_2\text{S}-\text{NH})_x$ -Ketten
"	160 - 220	min	nimmt ihre Konzentration und die des Tetrasulfimids zu. Sulfamid nimmt ab; Imidodisulfamid ist wie Trisulfimid in etwa gleicher Menge zugegen
"	220 - 460	min	Diese Entwicklung hält bis zum Ende der Reaktion an.

CH 20
 Reaktionsablauf
 $(\text{H}_2\text{N})_2\text{SO}_2$ mit
 Cl_2SO_2 (3 : 1)
 in siedendem
 CH_3CN
 255 - 460 min
 Fl 1 LZ 12 h




Da im Zeitraum von 4-8 h die Sulfamid-Konzentration sehr stark absinkt, arbeiteten wir Umsetzungen von 24 g $(\text{H}_2\text{N})_2\text{SO}_2$ in 75 ml CH_3CN mit 10,8 g zutropfendem Cl_2SO_2 (in 50 ml CH_3CN) (Molverhältnis 3 : 1) nach 4 h und 8 h auf $(\text{NH}_4\text{NSO}_2)_4$ auf.

Ausbeuten nach 4 h: 0,8 g (5 %) bezogen auf SO_2Cl_2
 8 h: 2,1 g (13,4 %) bezogen auf SO_2Cl_2
 16 h: 15,7 g (58,3 %) bezogen auf SO_2Cl_2
 20 h: 24,4 g (87 %) bezogen auf SO_2Cl_2

Untersuchung des Acetonitrils der Umsetzung Sulfamid mit
 SO_2Cl_2 (3 : 1)

Saugt man nach 20 h Reaktionsdauer das CH_3CN unter Feuchtigkeitsausschluß ab, so erhält man eine völlig klare Lösung. Ihr Chromatogramm läßt Tetrasulfimid, Polysulfimidsulfonsäuren (als Sulfohalogenide) in Lösung ?), Imidodisulfamid sowie geringe Sulfamidreste (CH 21) erkennen. Bereits nach 1 h hat sich wieder Substanz ausgeschieden, deren Schmp: $271^\circ - 279^\circ$ ist. Das Ba-Salz dieser Substanz löst sich in kalter 2 n HCl.



CH 21

156,2; 155,0 mg Sbst. benötigen 16,50; 16,20 ml 0.1 n H_2SO_4
 129,5 mg Sbst. 311,4 mg BaSO_4

NH_4NSO_2 Ber: S 33,4 N_{NH_4} 14,6
 (96) 33,0 14,8
 . 14,7

S-N-Verbindungen in CH_3CN

Fl 1 LZ 14 h

Bahn I: 3 μ l $\text{CH}_3\text{CN}/\text{NH}_3$

Bahn II: 3 μ l T 1

Rückstand der Umsetzung von Sulfamid mit SO_2Cl_2 in
siedendem CH_3CN

Der Rückstand (44,3 g) einer 24 h Umsetzung von 48 g Sulfamid und 21,6 SO_2Cl_2 in siedendem CH_3CN wird papierchromatographisch untersucht.

Das Chromatogramm CH 22 weist auf: Sulfamid-mono-sulfonat, Sulfamid-disulfonat, Sulfat, Polysulfimid-sulfonate, Tri-sulfimid und Tetrasulfimid.

Die wässrige Lösung reagiert neutral, die mit Ba^{2+} erzielte Fällung löst sich in kalter 2 n HCl. Die Fällung mit Ag^+ löst sich in 2 n HNO_3 , läßt sich aber nicht aus Wasser umkristallisieren. Der Schmp. des Rückstandes beträgt 215° . Lösungsversuche in Chloroform, Methylenchlorid, Dimethylformamid, Äther, Petroläther und Aceton hatte keinen Erfolg. In Methanol wird ein Teil gelöst, der, chromatographisch untersucht, sich als Gemisch mehrerer Substanzen erwies.



CH 22

Rückstand der Umsetzung von $(\text{H}_2\text{N})_2\text{SO}_2$ und Cl_2SO_2 (Molverhältnis 3 : 1) in CH_3CN

Fl 1 LZ 14 h

Bahn I: Rückstand

Bahn II: 3 μ l T 1

Untersuchung des festen Reaktionsgutes der Umsetzung
Sulfamid mit SO_2Cl_2 (Molverhältnis 3 : 1) in siedendem CH_3CN

Die Mutterlauge einer Umsetzung von $\text{SO}_2(\text{NH}_2)_2$ mit Cl_2SO_2 im Molverhältnis 3 : 1 (24 h Reaktionsdauer, zutropfendes Cl_2SO_2) wurde zweidimensional chromatographiert, um alle noch vorhandenen N-S-Verbindungen zu erfassen (CH 23).


CH 23

Fl 1; 12 h; senkrecht dazu

Fl 2; 12 h

5 l aus der $(\text{NH}_4\text{NSO}_2)_4$ -Darstellung.

Molverhältnis 3 : 1 (bei zutropfendem Cl_2SO_2 in CH_3CN)



In einem weiteren Versuch wurden dieser Mutterlauge noch Sulfamid-disulfonat, Imidodisulfonat und Sulfamid-disulfonat zugesetzt (CH 26). Die beiden Chromatogramme sind identisch.

CH 26


Fl 1 12 h; senkrecht dazu Fl 2 12 h

5 μl Umsetzungsprodukte aus der $(\text{NH}_4\text{NSO}_2)_4$ -Darstellung (Molverhältnis 3 : 1) + IDS, SAMS, SADS zweidimensional

IR-Spektren von Sulfamido-acet-immonium-chlorid,
 $H_3C-C(=NH_2^+Cl^-)NH-SO_2-NH_2$, und N-Amino-sulfonyl-
acetamidin, $H_3C-C(=NH)NHSO_2NH_2$

von Dr. E. Lindner, Institut für Anorganische Chemie
 der Universität Erlangen (Vorstand: Prof. Dr. H. Behrens).

Auf Grund der vorhandenen Symmetrieelemente gehört
 das Sulfamid eindeutig zur Punktgruppe C_{2v} . Da ein fünfatomi-
 ges Modell (bei Annahme von NH_2 als Punktmasse) vorliegt,



sind insgesamt 9 IR-aktive Normalschwingungen, davon 4 Valenz-
 schwingungen der Rassen A_1 , B_1 und B_2 zu erwarten. Nach der
 Schwingungsanalyse können folgende Absorptionsbanden zugeordnet
 werden (vgl. auch K. Andreß und H. Hofmann, 92).

$\nu_1(A_1)$	(IR,R)	$\nu_6(B_1)$	(IR,R)
ν_{S-N}	: 536 cm^{-1} (ss)	ν_{S-N}	: 560 cm^{-1} (m)

$\nu_2(A_1)$	(IR,R)	$\nu_7(B_1)$	(IR,R)
ν_{S-O}	: 1169 cm^{-1} (ss)	$\rho_w S(NH_2)_2$	--

$\nu_3(A_1)$	(IR,R)	$\nu_8(B_2)$	(IR,R)
ν_{N-S-N}	: 905 cm^{-1} (s)	ν_{S-O}	: 1360 cm^{-1} (ss)

$\nu_4(A_1)$	(IR,R)	$\nu_9(B_2)$	(IR,R)
δ_{O-S-O}	: 935 cm^{-1} (m)	$\rho_r S(NH_2)_2$	--

$\nu_5(A_2)$	(R)
--------------	-----


$\nu_{\text{as N-H}} : 3346 \text{ cm}^{-1} \text{ (ss)}$

$\nu_{\text{sym N-H}} : 3249 \text{ cm}^{-1} \text{ (s)}$

$\delta_{\text{N-H}} : 1558 \text{ cm}^{-1} \text{ (m)}$


$\rho_{\text{N-H}} : 725 \text{ cm}^{-1} \text{ (s)}$

Durch formale Substitution eines H-Atoms im Sulfamid durch den Acetamidin-Rest ($R = \text{H}_3\text{C}-\text{C}(=\text{NH})-$) wird die Symmetrie des Moleküls herabgesetzt. Betrachtet man NH_2 bzw. NHR als Punktmassen




so gehören Sulfamido-acet-immonium-chlorid und N-Amino-sulfonyl-acetamidin zur Punktgruppe C_s . Erwartungsgemäß ist im Spektrum des N-Amino-sulfonyl-acetamidins die asymmetrische S-O-Valenzschwingung nach langen Wellen verschoben, während die asymmetrische S-O-Streckschwingung um ca. 8 Wellenzahlen im Bereich höherer Frequenzen absorbiert. Vergleicht man die IR-Spektren des freien Amidins und des Hydrochlorids (C_s) miteinander, so fällt auf, daß die C-N-Valenzschwingung im Hydrochlorid nach längeren, die C=N-Valenzschwingung dagegen nach kürzeren Wellen verschoben ist. Damit ist einerseits der salzartige Charakter der Verbindung $\text{H}_3\text{C}-\text{C}(=\text{NH}_2^+\text{Cl}^-)\text{NH}-\text{SO}_2-\text{NH}_2$, andererseits aber auch das Vorliegen von Wasserstoffbrücken in beiden Verbindungen bewiesen. Die Tatsache wird auch erhärtet durch die Verschiebung der N-H-Valenzschwingung nach längeren Wellen, wie sie in beiden Fällen auch erfolgt. Im Spektrum des Sulfamido-acet-immonium-chlorids erhält man im Bereich der $\nu_{\text{N-H}}$ eine sehr breite und intensive Absorption.

Durch die Ausbildung der "H-Brücken" wird die Stabilität der beschriebenen Verbindungen H_2N-SO_2-NHR ($R: H_3C-C(=NH)$ bzw. $H_3C-C(=NH_2^+)-$) wesentlich erhöht. Das freie Amidin kann durch folgende mesomere Grenzformeln beschrieben werden:



Nach dem IR-Spektrum dürfte dem Modell II die größere Bedeutung zukommen. Blockiert man ein freies Elektronenpaar am negativ aufgeladenen Stickstoff durch Anlagerung eines Protons, so liegt das Gleichgewicht auf der Seite des Modells I



Bemerkenswerterweise sind die Frequenzverschiebungen im Salz nicht in dem Maße ausgeprägt wie bei der Base. Dies läßt auf einen geringeren Anteil an Wasserstoffbrückenbindung schließen.

	N-Amino-sulfonyl- acet-amidin	Sulfamido-acet- immoniumchlorid	Sulfamid
Phase	fest/KBr	fest/KBr	fest/KBr
ν_{S-O} in cm^{-1}	1171,8 (A') (m)	1190 (A') (ss)	1164(A ₁)(ss)
	1291 (A'')(ss)	1325,9(A'')(m)	1360(B ₂)(ss)
ν_{C-N}	1127 (ss)	1100,3 (m)	
$\nu_{C=N}$	1672 (s)	1691 (ss)	
$\delta_{N-C=N}$	1028 (w)	1047 (w)	
δ_{N-S-N}	910 (m)	930 (sl)	905 (s)
δ_{O-S-O}	956 (m)	945 (s)	935 (m)
ν_{N-H}	3421 (s)	3354,5 (ss)	3346 (ss)
	3336 (ss)	3142 (ss)	3249 (s)
	3249 (s)		1558 (m)
	3205 (s)		725 (s)

Die im Bereich 2800 - 3000 cm^{-1} auftretenden Banden können C-H-Schwingungen zugeordnet werden.

Abkürzungen: ss sehr stark
s stark
m mittel
w schwach
sl Schulter
IR = IRaktiv
R = ramanaktiv

Die Aufnahme der Spektren erfolgte mit einem Beckman IR-7-Gerät (NaCl mit Gitter).

Herrn Prof. Dr. H. Behrens sei an dieser Stelle für sein großzügiges Entgegenkommen, für die Aufnahme der IR-Spektren und für die Überlassung von Institutsmitteln besonders herzlich gedankt.

LITERATURVERZEICHNIS

- 1) A. Pinner: Die Imidoäther und ihre Derivate, Berlin 1892
- 2) A. Pinner, F. Klein; Ber. deutsch. chem. Ges. 10, 1839 (1877)
- 3) P. Eitner; Ber. deutsch. chem. Ges. 25 (1892) 461
- 4) P. Eitner; Ber. deutsch. chem. Ges. 26, 2833 (1893)
- 5) P. Eitner; Ber. deutsch. chem. Ges. 26, 2836 (1893)
- 6) K. Bencker, G. Leiderer, A. Meuwesen; Z. anorg. allg. Chem. 324, 202 (1963)
- 7) A. Stübinger; Dissertation Erlangen 1962
- 8) A. Streckler; Ann. Chem. 103 328
- 9) G. Leiderer; Diplomarbeit, Erlangen 1959
- 10) H. Römpf; Chemie-Lexikon, Franck'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 1962
- 11) R. Appel, G. Berger; Z. anorg. allg. Chemie 327, 114 (1964)
- 12) H. M. Barnes, D. Kundiger, S. M. Mc Elvain; J. Amer. Chem. Soc. 62, (1940) 1286
- 13) Beilstein II; 2. Ergänzungsband, 1942, 184
- 14) W. Traube, E. Reupke; Ber. deutsch. chem. Ges. 56, 1656 (1923)
- 15) E. Chombers, G. W. Watt; J. Org. Chem. 6, 376 (1941)
- 16) Hopkins, Williams; Organic Reagents for Organic Analysis, Chadwill Heath, Essex, England, 1950
- 17) P. W. Neber, A. Uber; Ann. Chem. 467, 70
- 18) A. Weissberger, E. Droskauer, I. Riddick, E. Toops; Organic Solvents, Interscience, N. York, 1955
- 19) W. Siegelin; Dissertation Erlangen 1965
- 20) K. Ziegler in Houben Weyl-Müller 4, II 738 (1955)
- 21) H. Krauch, H. Kunz; Namenreaktionen in der organischen Chemie, Heidelberg, Hüthig-Verlag 1961
- 22) A. Meuwesen, Th. Papenfuss; Z. anorg. allg. Chem. 318, 140 (1962)
- 23) A. Hantzsch, A. Holl; Ber. deutsch. chem. Ges. 34, 3430 (1901)
44, 3436
- 24) M. Danner; Dissertation, Erlangen 1964
- 25) G. Kaiser; Diplomarbeit, Erlangen (1963)
- 26) M. Matsui; Chem. Z. 1911 I, 982
- 27) S. Jshikawa; J. Chem. Soc. Japan 42, 579 (1921)
- 28) S. Jshikawa; C. A. 10, 1588 (1922)

- 29) A. Heymons; D. P. 839 493 (1952)
- 30) A. Heymons; C. A. 47, 1737 (1953)
- 31) E. B. Knott; J. Chem. Soc., London, 1945, 686
- 32) M. Danner; Diplomarbeit, Erlangen 1962
- 33) A. W. Kirssanow; C. A. 1950g (1951)
- 34) E. Nordmann; Ber. dtsh. chem. Ges. 17, 2746
- 35) A. Hantzsch; Ber. dtsh. chem. Ges. 64, 667 (1931)
- 36) G. J. Iranz, S. Danyluk; Chem. Rev. 221 (1960)
- 37) F. Klages, R. Ruhnan, W. Hauser; Ann. d. Chem. 626, 1964
- 38) G. J. Iranz, S. S. Danyluk; J. Chem. Soc. 81, 3846 (1959)
- 39) " " " " " " " " 81, 3850 (1959)
- 40) " " " " " " " " 81, 3854 (1959)
- 41) R. S. Mullihen; J. phys. Chem. 56, 801 (1952)
- 42) V. A. Pleskov; J. phys. Chem. USSR 22, 351 (1948)
- 43) F. E. Murray; Canad. J. Chem. 33, 797 (1955)
- 44) D. Zöllner; Diplomarbeit, Erlangen 1963
- 45) J. N. Ashley, H. A. Barber, A. J. Ewins, G. Newberry,
A. D. H. Self; J. Chem. Soc. 1942, 103 - 116
- 46) A. J. Ewins, J. N. Ashley; US-Patent 2 204 983 (1940)
Brit. Patent 510 097 (1939)
- 47) R. Asmus; Organische Synthesen, F. Vieweg & Sohn,
Braunschweig (1937)
- 48) H. Oertel; Diss., Erlangen 1957
- 49) A. W. Kirssanow, J. M. Solotow; J. allg. Chem. (russ.) 20,
1673 (1950)
- 50) A. W. Kirssanow, J. M. Solotow; J. allg. Chem. (russ.) 20,
1790 (1950)
- 51) K. H. Reichelt; Dissertation, Erlangen 1959
- 52) W. Siegelin; Diplomarbeit, Erlangen 1963
- 53) A. W. Kirssanow; C. A. 1950g (1951)
- 54) G. Plott; Dissertation, Erlangen 1962
- 55) A. W. Hofmann; Ber. dtsh. chem. Ges. 14, 2725 (1881)
- 56) " " " " " " " " 15, 407,752,762 (1882)
- 57) " " " " " " " " 17, 1406 (1884)
- 58) " " " " " " " " 18, 2734 (1985)
- 59) H. A. Lehman, G. Kempe; Z. anorg. allg. Chem. 309, 71

- 60) W. Joseph; Dissertation, Erlangen 1955
- 61) R. Appel, W. Huber; Z. anorg. allg. Chem. 275, (1954) 338
- 62) P. Walden; Ber. dtsch. chem. Ges. 40, 3215 (1907)
- 63) H. J. Barber; J. Chem. Soc., 1943, 101
- 64) E. H. Northey, A. E. Pierce, P. J. Kertesz; J. Amer. Chem. Soc. 64, 2763 (1942)
- 65) G. Leiderer; Dissertation, Erlangen 1963
- 66) W. Joseph; Diplomarbeit, Erlangen 1953
- 67) G. Hesse, J. Daniel, G. Wohlleben; A. Ch. 64, 103 (1952)
- 68) G. Wohlleben; A. Ch. 67, 741 (1955)
- 69) G. Wohlleben; A. Ch. 68, 752 (1956)
- 70) Woelm-Mitteilungen Al 7, Chromatographie mit Aluminium-oxiden "Woelm" (1958), Firmenschrift M. Woelm, Eschwege
- 71) F. Kaufler, C. Pomeranz; M. Chem. 22, 495 (1901)
- 72) Erdmann, Kutsch J. pr. (1) 25, 506
- 73) Dessaigne; J. 1854, 677
- 74) L. Vanino; Handbuch der präparativen Chemie, F. Enke, Stuttgart (1925)
- 75) Stevens; J. Chem. Soc. 81, 79
- 76) A. Hantzsch; Ann. Chem. 296, 94
- 77) K. H. Wheeler, E. F. Degering; J. Amer. Chem. Soc. 66, 1242 (1944)
- 78) A. M. Paquin; A. Ch. 60, A 319 (1948)
- 79) K. Hamann; Farbf. Bayer, DBP 869065, CA. 1955, 10137
- 80) A. Pinner; Ber. dtsch. chem. Ges. 17, 178 (1884)
- 81) A. Pinner; Ber. dtsch. chem. Ges. 16, 1654 (1883)
- 82) R. Appel, M. Goehring; Z. anorg. allg. Chem. 271, (1953)
- 83) L. F. Wieninger; Z. anal. Chem. 112, 363 (1938)
- 84) F. Z. Hahn; Z. anorg. all. Chem. 93, 241 (1933)
- 85) H. A. Lehman, G. Kempe; z. anorg. allg. Chem. 309, 71
- 86) G. Zimmermann; z. anal. Chem. 138, 321 (1953)
- 87) A. Gröne; Technik und Fehlermöglichkeiten in der Papierchromatographie, Firmenschrift Schleicher & Schüll, Dassel, Kreis Einbeck
- 88) F. Arndt; Ber. dtsch. chem. Ges. 54, 2237 (1921)
- 89) W. W. Katschynkina; Chem. Z. 129, 2412 (1958)
- 90) L. Hupfer; Dissertation, Erlangen
- 91) H. A. Lehman, G. Kempe; Chem. Techn. 2, 719 (1957)
- 92) H. J. Hofmann, K. Adress, Z. anorg. allg. Chem. 284,
234 (1956)

L e b e n s l a u f

Am 23. September 1938 wurde ich, Dieter Z ö l l n e r , als erster von zwei Söhnen des Generaldirektors Hans Zöllner und seiner Ehefrau Elisabeth, geb. Weißfloch, in Lauf (Pegnitz) geboren.

Von 1944 bis zum Sommer 1948 ging ich in Lauf (Pegnitz) und Röthenbach (Pegnitz) in die Volksschule. Die Aufnahmeprüfung für die höhere Schule legte ich in Hersbruck ab und beendete den Besuch der dortigen Oberrealschule nach 9 Jahren mit der Reifeprüfung im Sommer 1957.

Zu Beginn des Winter-Semesters 1957/58 immatrikulierte ich mich an der Universität Erlangen für das Chemiestudium. Am 1. Juli 1960 unterzog ich mich der Diplomchemiker-Vorprüfung und legte am 19. Juni 1962 das Diplomchemiker-Hauptexamen ab. Am 2. Dezember 1963 erhielt ich den Titel eines Diplomchemikers.

Am Institut für Anorganische Chemie der Universität Erlangen bin ich seit 1. November 1960 als studentische, seit 1. Januar 1963 als wissenschaftliche Hilfskraft und seit 2. Dezember 1963 als Verwalter der Dienstgeschäfte eines planmäßigen wissenschaftlichen Assistenten beschäftigt.



Buchdruck und Fotodruck: Ludwig Müller, Erlangen, Fahrstraße 5